

Отъ Григорія Михайловича Стребкова	1
— Александра Васильевича Сисоева	50
— Ивана Ивановича Спаськова	20
— Ивана Алексеевича Платонова	50
— Никодима Ивановича Пережогина	2
— Ивана Давыдовича Кобозева	1
— Якова Федоровича Львова	1
— Якова Петровича Фальчевскаго	50
— Владимира Николаевича Плеханова	1
— Михаила Михайловича Говорова	50
— Василия Яковлевича Маслова	1
— Ростислава Парменовича Кисельбашева	1
— Александра Федоровича Кузнецова	50
— Казначей Еськова	15
— Бухгалтера Мазура	5

Помощники Бухгалтера:

— Щиголева	2
— Перекладнева	1 50
— Писемоводителя Савенкова	2

Канцелярские служители:

— Васильева	1
— Малыгина	50
— Крестинскаго волост. писаря Болотова	1
— Дворянина Ивана Алексеевскаго	50
— Надворнаго совѣтника Н. Пожидаева	1
— Титулярнаго совѣтника П. Ревякина	30
— Почетнаго гражданина В. Туранскаго	50
— Михаила Федоровича Михайлова	1
— Иосифа Чепчезова	1
— Надежды Разумовой	30
— Нотариуса Н. Синегубина	5
— Тимскаго мѣщанина А. Смирнова	1
— Священника Александра Егорова	1
— Григорія Васильева Дойникова	50
— Тимскаго мѣщанина Никандра Амосова	50
— Крестьянъ Дмитріевскаго и Зыбинскаго сельскихъ обществъ	40
— Крестьянъ Высковской волости по особому списку	11 63

Итого . . . 2059 6

А всего съ прежде поступившими . . . 27111 69
(25052 р. 63 к.).

Изъ нихъ 500 руб. отпущено Гофмаршалу Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, а 26400 руб. передано чрезъ Курское Отдѣленіе Государственнаго Банка въ Московскій Главный Комитетъ по сбору пожертвованій на приобрѣтеніе судовъ dobrovol'nogo флота.

Записка о мѣрахъ предупредительныхъ при развитіи тифозной эпидеміи и другихъ повальныхъ болѣзней, составленная III Отдѣленіемъ русскаго общества охраненія народнаго здравія.

1. Повальные болѣзни происходятъ отъ поступленія въ тѣло человека особыхъ заразительныхъ веществъ. Изъ повальныхъ болѣзней одні называются мiasmатическими или повѣтренными, а другія — контагиозными или прилипчивыми. Въ настоящее же время поражающій петербургское населеніе тифъ является не въ одномъ только, а въ трехъ различныхъ видахъ: тифа брюшнаго, тифа сыпнаго или пятнистаго и возвратнаго тифа или возвратной горячки. Брюшной тифъ не причисляется къ прилипчивымъ болѣзнямъ, тогда какъ сыпной и возвратный прилипчивы, особенно сыпной; но еще болѣе прилипчивы корь, скарлатина и оспа. Вслѣдствіе этой разницы мѣры, принимаемыя противъ заразныхъ болѣзней не могутъ быть одинаковыми, одѣхъ мѣръ требуютъ прилипчивыя болѣзни, другія — повѣтренныя.

2. Прилипчиво называется такая болѣзнь, когда отъ одного больного въ жилищѣ распространяется зараза на окружающихъ его людей, живущихъ въ одной съ нимъ комнатѣ, квартирѣ или даже въ одномъ и томъ же домѣ. Зараза развивающаяся въ тѣлѣ больного, можетъ переходить въ воздухъ комнаты, и при его помощи переносится на окружающихъ больного. Поэтому и слѣдуетъ всегда заботиться о возможно скорой замѣнѣ воздуха испорченнаго въ комнатѣ больного свѣжимъ, такъ какъ свѣжій воздухъ имѣетъ силу или уничтожать, или значительно ослаблять дѣйствіе возразы. Последняя можетъ прилипнуть къ платью больного, его бѣлье, постели, почему необходимо и эти предметы обезвреживать.

3. Предупредительныя мѣры противъ этихъ болѣзней нужно раздѣлить на общественныя и личныя или домашнія. Общественныя мѣры состоятъ въ поддержаніи надлежащей чистоты улицъ, площадей и домовъ, въ снабженіи населенныхъ мѣстъ достаточнымъ количествомъ чистой воды, въ удаленіи изъ нихъ нечистоты надлежащими способами, въ осуше-

ніи почвы, въ заботахъ о доставленіи населенію здоровой пищи, въ постройкѣ здоровыхъ жилищъ и въ отдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ въ хорошо устроенныя больницы. Общественныя мѣры имѣютъ громадное значеніе въ предупрежденіи развитія повальныхъ болѣзней и гораздо большее, чѣмъ мѣры личныя, но всѣ онѣ очевидно не могутъ быть осуществлены въ минуту развитія эпидеміи, и приводимыя въ исполненіе уже при полномъ ея развитіи не вполне достигаютъ цѣли. Само населеніе должно участвовать въ ихъ выполненіи и содѣйствовать имъ всѣми способами.

4. Личныя же или домашнія предупредительныя мѣры заключаются въ удаленіи больного отъ здоровыхъ и въ дезинфекціи. Подъ дезинфицирующимъ средствомъ слѣдуетъ понимать все то, что служитъ къ уничтоженію заразныхъ веществъ и устраненію гніенія. Къ наилучшимъ дезинфицирующимъ средствамъ относятся: широкое провѣтриваніе, обильное употребленіе воды для поддержанія чистоты и опрятности какъ тѣла, одежды, такъ и жилищъ; жаръ, какъ сила разрушающая заразные вещества и нѣкоторые, ниже поименованныя химическія вещества.

5. Всякаго заразнаго больного, находящагося въ дурной обстановкѣ, слѣдуетъ отправить немедленно въ больницу, въ противномъ же случаѣ онъ долженъ быть непременно отдѣленъ въ особое помѣщеніе; ухаживаніе за больнымъ, отдѣленнымъ въ особую комнату, гораздо болѣе безопасно для окружающихъ, чѣмъ ухаживаніе при нахожденіи его въ общей жилой комнатѣ. Комнату больного слѣдуетъ тщательно и часто провѣтривать, не опасаясь простудить больного охлажденіемъ комнаты; провѣтриванію мы содѣйствуемъ открывая форточки, двери и часто пропалывая печи безъ закрытія трубъ. Кромѣ того, комната должна быть свѣтла, все лишнее — ковры, занавѣси и ненужную мебель должно удалить, равно какъ и заботиться о наибольшей чистотѣ. Испраженія и грязное бѣлье слѣдуетъ немедленно уносить и подвергать дезинфекціи; дезинфекція же воздуха въ помѣщеніи больного неумѣстна, она или можетъ прямо вредить больному, какъ напр. дезинфекція хлоромъ и карболовой кислотой, или только затемнить плохое производство провѣтриванія и мѣшать достаточно ясно оцѣнивать дѣйствительную свѣжесть воздуха въ комнатѣ, какъ это бываетъ при употребленіи терпентина и эфира.

6. По удаленіи больного изъ занимаемой имъ комнаты, слѣдуетъ, если возможно, и изъ соседнихъ комнатъ той же квартиры на время (на одинъ или два дня) удалить живущихъ въ нихъ квартирантовъ и подвергнуть все помѣщеніе тщательному очищенію и дезинфекціи. Для этой цѣли вся мебель выносится на открытый воздухъ, выколачивается и оставляется тамъ не менѣе двухъ и трехъ сутокъ. Въ комнатѣ же больного производится окуриваніе хлоромъ слѣдующимъ образомъ: на каждую комнату средней величины (10 куб. саж.) берется 3 ф. хлорной извести; она замѣшивается съ водой въ жидкую кашу и обливается 3 фунтами продажной соляной кислоты. Затѣмъ держатъ комнату съ закрытыми наглухо дверями и окнами въ теченіи сутокъ, послѣ чего, открывъ окна и трубы, оставляютъ окуриванную комнату провѣтриваться на два или три дня. Если же изъ квартиры невозможно переселеніе жильцовъ на время въ другую, то можно ограничиться тѣмъ, что вынесетъ мебель и все бывшее въ комнатѣ больного, всѣ ея деревянныя части обмынутъ растворомъ (1 ч. на 20 ч. воды) бѣлизной (хлорной) извести, сдѣлаютъ обол, перетираютъ потолокъ и стѣны, предварительно смочивъ ихъ растворомъ хлорной извести и затѣмъ выбѣлизуютъ ихъ известковымъ молокомъ изъ свѣже-гашеной извести.

Если наконецъ ни больной, ни его окружающіе не могутъ покинуть занимаемую ими комнату, то не слѣдуетъ его надолго оставлять въ одной и той же комнатѣ, но по возможности мѣнять его пребываніе въ каждой изъ нихъ, и во время его отсутствія въ комнатѣ имѣть оставленную держать форточки, и если можно даже окна открытыми при постоянной легкой топкѣ печи. Бѣлье для дезинфекціи слѣдуетъ погружать въ растворъ бѣлизной извести (1 ч. на 20) на короткое время (3—5 минутъ), тщательно затѣмъ промывать въ холодной водѣ во избежаніе его порчи, и развѣшивать для просушки и провѣтриванія; что касается одежды, то она должна быть подвергнута влиянію большого жара. Можно совѣтовать програваніе платья въ вольномъ духу рубашекъ и пачекъ, при чемъ слѣдуетъ остерегаться класть платье прямо на подъ печи, но разстлать его на веревочныхъ стѣжкахъ, прикрѣпленныхъ напр. на четырехъ ножкахъ опрокинутой низенькой табуретки или скамейки. Кромѣ того, платье больного можетъ быть обезврежено еще долгимъ вывѣтриваніемъ на открытомъ воздухѣ.

Примѣчаніе. Окуриваніе хлоромъ должно производиться съ осторожностью, такъ какъ при обливаніи соляной кислотой получается сильное выдѣленіе удушливаго хлорнаго газа. Если это по неосторожности послѣ развитія этого газа останется въ комнатѣ долгое время и почувствуется дурнота и удушье, то самое лучшее средство возстановить силы — это скорее выйти на свѣжій воздухъ. Должно замѣтить, что хлоръ обезцвѣчиваетъ всѣ краски и разрушаетъ ткани, почему нельзя имъ окуривать мебель и платье за исключеніемъ полшубовъ, которые при окуриваніи хлоромъ не разрушаются.

7. Помойныя и навозныя ямы должны быть часто вычищаемы, при чемъ ихъ срубъ смазывается дегтемъ; сами же онѣ могутъ быть дезинфицированы посыпкой хлорной извести. Выгребы съ нечистотами точно также должны часто очищаться и смазываться дегтемъ или каменноугольной смолой; дезинфицируютъ же ихъ преимущественно желѣзнымъ купоросомъ съ неочищенной карболовой кислотой при расчетѣ на 5 золотниковъ купороса и 2—3 золот. карбол. кислоты въ день на каждого человека, пользующагося выгребомъ. Ушаты съ нечистотами смазываются дегтемъ, керосиномъ и въ нихъ вливается продажная неочищенная карболовая кислота (2 ч. на 100) 1—2 раза въ день. Чуланы, погребѣ и шкапы съ провизіей должны содержаться въ чистотѣ и часто быть провѣтриваемы и вымываемы.

8. При сомнѣніи въ чистотѣ и доброкачественности воды, слѣдуетъ подобную воду кипятить и фильтровать чрезъ толченый уголь.

9. Брюшной тифъ не прилипчивъ, но заболѣвшій брюшнымъ тифомъ можетъ служить источникомъ распространения болѣзни, такъ какъ только испраженія больного обладаютъ заразительной силой, которая однако можетъ обнаруживать свое дѣйствіе, нрѣдко весьма губительное, лишь при извѣстныхъ мѣстныхъ условіяхъ, со стороны почвы или жилищъ. По мнѣнію многихъ, брюшной тифъ можетъ возникать вновь въ формѣ отдѣльныхъ случаевъ и маленькихъ эпидемій вслѣдствіе отравленія воздуха или воды находящимися въ разложеніи нечистотами. Но наше эпидеміи возникаютъ подъ влияніемъ особыхъ мѣстныхъ условій — почвенныхъ, послѣ предварительнаго заноса заразительнаго начала. Главныя мѣры предосторожности противъ брюшнаго тифа заключаются въ тщательной дезинфекціи испраженій и запачканнаго ими бѣлья и платья больныхъ, равно и здоровыхъ, совместно живущихъ. Обильное снабженіе населенныхъ мѣстъ чистой водой, правильное удаленіе нечистоты, осушеніе почвы — вотъ тѣ мѣры, приложимыя и въ отношеніи прочихъ заразныхъ болѣзней, но въ частности и въ особенности необходимыя для ослабленія и искорененія эпидемій брюшнаго тифа. Лекарствъ, предупреждающихъ заболѣваніе брюшнымъ тифомъ — нѣтъ. Человекъ заболѣвшій имъ сваливается обыкновенно, не сразу. Первые признаки навѣще состоятъ въ головной боли и легкомъ пошатываніи, ослабленіи аппетита и небольшомъ поносѣ. Лихорадочное состояніе постепенно возрастаетъ; рѣже болѣзнь прямо начинается сильнымъ ознобомъ. Чѣмъ раньше больной ложится въ постель и обрабатывается за совѣтомъ къ врачу, тѣмъ это выгодно для благопріятнаго теченія болѣзни. До совѣта съ врачомъ можно рекомендовать только постельное содержаніе, соблюденіе диеты (животная, преимущественно жидкая пища, бульонъ, молоко).

10. Сыпной или пятнистый тифъ весьма прилипчивъ. Зараза распространяется чрезъ отдѣленія кожи и легкаго, держится на стѣнахъ комнатъ съ больными на платьѣ, и если нѣтъ провѣтриванія, или оно недостаточно, долго можетъ сохраняться. Чѣмъ лучше провѣтривается комната больного, чѣмъ болѣе соблюдается чистоплотность, тѣмъ меньшая опасность зараженія для окружающихъ. Условія для распространения сыпнаго тифа заключаются главнымъ образомъ въ переполненіи жилищъ при недостаточномъ провѣтриваніи, въ грязномъ пропитанномъ кожными испареніями платьѣ, при прочей дурной обстановкѣ. Изъ сказаннаго выходитъ, что для предупрежденія распространения болѣзни необходимо бдительно по возможности уединять, для ухаживанія лучше выбирать людей перенесшихъ сыпной тифъ, не допускать ненужныхъ посѣтителей, и при посѣщеніи избѣгать соприкосновенія съ больными; всѣ вещи (занавѣси, ковры, мебель), оставая только не обходимое, изъ комнаты вынести дезинфицировать, последнюю хорошо и неослабно провѣтривать, соблюдать крайнюю чистоплотность. Постели и одежду, бывшія въ употребленіи у больного, должны тщательно дезинфицироваться, или лучше уничтожать, сжигать особенно бѣлье. По выздоровленіи, комнаты и мебель должны быть подвергнуты тщательному очищенію и дезинфекціи. Сыпной тифъ болѣею частью начинается быстро, иной разъ послѣ легкаго нездоровья въ