морозѣ, бывали нечасто. Снѣгу вообще было много, вѣтры преобладали С.-В., С.-З., В., З. и С. Мартъ мѣсяцъ до 20-хъ чиселъ былъ тоже холоденъ; послѣ 20-го погода сдѣлалась перемѣнчивой; термометръ то повышался, то падалъ; часто шелъ снѣгъ; рѣдко дождь, но вообще продолжалась холодная погода, и полное таяніе снѣга наступило въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, который все же былъ, относительно, холоднѣе обыкновеннаго, и довольно сухъ; дожди были рѣдки и не сильны. Въ маѣ наступила теплая,—сырая погода; дожди шли весьма часто, вся растительность быстро и роскошно развилась. Вѣтры весною были перемѣнные, но преобладали западные, юго-западные, юго-восточные, рѣже сѣверо-западные и южные, въ началѣ мая иногда бывали такъ сильны, что срывали крыши съ домовъ. Электрическія явленія бывали рѣдко и не сильны.

Лѣто все было умѣренно-теплое; сильныхъ жаровъ было мало; все время, за немногими исключеніями, погода была ясная, сухая; дожди составляли рѣдкое явленіе. Вѣтры были умѣренные, по преимуществу Ю.-В., В., Ю., С.-В., рѣже С.-З., З. и С. Грозы съ молніей и громомъ были рѣдки и чаще во второй половинѣ августа.

Осень до конца октября была сплошь теплая и сухая, дожди начали идти въ концѣ октября и началѣ ноября; во второй половинѣ ноября начали появляться морозы, по временамъ шелъ снѣгъ и дождь, санная дорога, при усилившихся морозахъ установилась около десятыхъ чиселъ декабря и вплоть до конца года погода стояла умѣренно-холодная, ясная; снѣжныхъ мятелей и пасмурныхъ дней было мало. Вѣтры умѣренные, были перемѣнчивые, но и при вѣтрахъ южныхъ термометръ мало повышался и оттепели не было.

Урожай въ Курской губерніи былъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ очень хорошій, въ большинствѣ средній, а въ нѣкоторыхъ и ниже средняго. Качествомъ, вслѣдствіе лѣтней засухи, хлѣбныя зерна вышли мельче и легче. Сѣна собрано достаточно, урожай ягодъ, фруктовъ былъ умѣренный; овощи родились хорошо и обильно.

Въ санитарномъ отношеніи 1883 годъ былъ тоже лучше прошедшаго для народонаселенія Курской губерніи; заразныя болѣзни: дифтеритъ, тифъ, дизентерія, скарлатина, корь встрѣчаются въ меньшемъ количествѣ и менѣе злокачественнаго свойства.

Преобладающими болѣзнями въ теченіи года были весьма распространенныя перемежающіяся, лихорадочныя болѣзни (malaria), катарральныя, воспаленія, ревматизмы, нервныя и нервноревматическія болѣзни.

Дифтеритъ въ теченіи всѣхъ мѣсяцевъ въ году и во всѣхъ пятнадцати уѣздахъ губерніи встрѣчался спорадически, не принимая нигдѣ эпидемическаго распространенія, и въ каждой мѣстности съ болѣе или менѣе значительными промежутками между появленіемъ новыхъ заболѣваній. Самое большее число больныхъ дифтеритомъ было въ Суджанскомъ уѣздѣ и въ особенности въ волостяхъ, окружающихъ заштатный городъ Миропольe, при чемъ на какія нибудь особенныя причины, способствующія господству болѣзни въ этой мѣстности, указать пока не оказывается возможнымъ. По собраннымъ свѣдѣніямъ всѣхъ больныхъ дифтеритомъ по Курской губерніи въ 1883 г. было противу 1882 года (въ которомъ было 10.468), менѣе, а именно: 6202, изъ которыхъ выздоровѣло 4126, умерло 2018 и осталось больныхъ къ 1 января 1884 года 58.

По уѣздамъ:

Въ Суджанскомъ	бол.	1149	воз.	837	ум.	306
— Корочанскомъ	—	850	—	540	—	302
— Путивльскомъ	—	673	—	427	—	240
— Грайворонск.	—	589	—	389	—	194
— Бѣлгородскомъ	—	512	—	324	—	187
— Старооскольск.	—	507	—	316	—	182
— Рыльскомъ	—	405	—	244	—	159
— Курскомъ	—	370	—	274	—	82
— Новооскольск.	—	364	—	292	—	71
— Льговскомъ	—	323	—	187	—	136
— Тимскомъ	—	220	—	110	—	110
— Дмитріевскомъ	—	105	—	71	—	34
— Обоянскомъ	—	85	—	45	—	35
— Фатежскомъ	—	27	—	18	—	9
— Щигровскомъ	—	23	—	16	—	7

Что касается казуистики болѣзни, то она въ главныхъ чертахъ сохраняла прошлогодній характеръ: всѣ тяжкіе случаи заболѣванія въ первые дни болѣзни сопровождались болѣе или менѣе значительнымъ возвышеніемъ температуры тѣла; въ дальнѣйшемъ же теченіи и въ самыхъ тяжелыхъ видахъ болѣзни, температура чаще всего падала до нормы, хотя пульсъ при адинамическихъ явленіяхъ ускорялся очень и ослабѣвалъ, въ смертельныхъ случаяхъ температура, даже, понижалась иногда ниже нормы незадолго до смерти. Самыя опасныя формы болѣзни встрѣчались у золотушныхъ, малокровныхъ, съ желтымъ блѣднымъ, олигемическимъ цвѣтомъ лица и кожи вообще, при чемъ у такихъ субъектовъ, при даже не слишкомъ сильныхъ и распространенныхъ дифтерическихъ отложеніяхъ въ зѣвѣ, сильно распухали миндалевидныя и шейныя лимфатическія желѣзы, и общее лихорадочное состояніе принимало заразный адинамическій характеръ, приближающійся къ септиэмическому; второй видъ субъектовъ, подвергавшихся болѣе сильной формѣ болѣзни, были лица, повидимому, цвѣтущаго здоровья, съ свѣжимъ цвѣтомъ лица, но при томъ полносочныя съ мягкими тканями (fibra laxa древнихъ) при извѣстной степени малокровія, съ слабоватымъ пульсомъ и очень впечатлительной, нервной системой; у нихъ отложенія имѣли наклонность къ большому распространенію въ полости зѣва и переходу на слизистую оболочку носа, гортани и дыхательныхъ вѣтвей и иногда и другія; язвы въ горлѣ принимали язвенный и, даже, гангренозный характеръ; сопутствующая лихорадка представляла выраженіе гнилостнаго зараженія крови; иногда, даже, дифтерическія отложенія быстро исчезали, оставляя глубокія, чистыя, безъ гноя, язвы, но вмѣстѣ развивалась, часто піэмическаго свойства лихорадка и больные гибли безпощадно и совершенно такъ же какъ и въ другихъ случаяхъ гнойнаго зараженія. Послѣдовательные параличи въ періодъ выздоровленія встрѣчались относительно рѣдко.

Дизентерическій процессъ въ спорадической формѣ встрѣчался по всей губерніи, не принимая нигдѣ эпидемическаго распространенія, исключая Грайворонскаго и Рыльскаго уѣздовъ, гдѣ болѣзнь имѣла нѣсколько большее распространеніе. По доставленнымъ свѣдѣніямъ, больныхъ дизентеріей по губерніи было 843, изъ которыхъ выздоровѣло 624, умерло 219; слѣдовательно меньше прошлогодняго вдвое. Болѣзнь представляла характеръ катаральный, флегмонозный и, рѣже, дифтерическій.

Тифозныя горячки встрѣчались по губерніи во всѣ времена года преимущественно осенью, зимою и весною, рѣже лѣтомъ; значительнаго эпидемическаго характера болѣзнь нигдѣ не обнаружила. Всѣхъ извѣстныхъ случаевъ было 1915, изъ нихъ выздоровѣло 1261, умерло 194, въ остальныхъ случаяхъ исходъ болѣзни не извѣстенъ. По уѣздамъ болѣе всего случаевъ заболѣванія было въ Корочанскомъ уѣздѣ, именно:

Въ Корочанскомъ	заб.	971	выз	814	ум.	157;
— Фатежскомъ	—	400	—	—	—	—
— Грайворонск.	—	241	—	224	—	17
— Путивльскомъ	—	178	—	167	—	11
Рыльскомъ	—	75	—	15	—	—
— Бѣлгородскомъ	—	56	—	53	—	3

Въ остальныхъ уѣздахъ число больныхъ было незначительное. Въ этомъ количествѣ больныхъ, какъ и въ прежніе годы, преобладающимъ видомъ болѣзни былъ брюшной тифъ, за нимъ, по числу больныхъ, слѣдуетъ возвратная горячка; сыпная форма встрѣчалась весьма рѣдко. Болѣзнь имѣла большею частію умѣренную степень напряженія; продолжительность болѣзни была отъ трехъ до четырехъ недѣль; выздоровленіе соотвѣтственно силѣ болѣзни было болѣе или менѣе продолжительно. Выдающимися явленіями были: типическое теченіе жару, характеристическія пораженія кишекъ въ правой подвздошной сторонѣ, поносы, изрѣдка, кишечныя кровотеченія въ несильной степени, чаще кровотеченія изъ носа, головныя боли, больше въ началѣ болѣзни, бредъ, дикратическій пульсъ. Пораженія легкихъ выражались катарральными явленіями, уплотненіемъ ткани въ нижнихъ доляхъ сзади. Воспаленія околоушныхъ желѣзъ и пролежни случались рѣдко. Возвратныя горячки представляли умѣренную степень напряженія. Отдѣльные періоды болѣзни продолжались отъ 3-хъ, 4-хъ до 6 и 7 дней, причемъ первые приступы были продолжительнѣе остальныхъ; окончаніе приступовъ сопровождалось обильными потами и быстрымъ пониженіемъ температуры. Исходъ возвратныхъ лихорадокъ, почти исключительно, былъ благопріятный.

Оспа въ 1883 году господствовала несравненно больше прошлогодняго, въ особенности къ концу года осенью и зимою. Въ семи уѣздахъ она получила значительное распространеніе, въ остальныхъ господствовала спорадически; преобладающей формой болѣзни была вѣтренная оспа—варіолидъ и варицелла, но и случаевъ натуральной оспы было больше чѣмъ въ истекшіе годы въ особенности у лицъ, которымъ не привита была оспа. По доставленнымъ свѣдѣніямъ, которыя не полны, такъ что представленныя цифры несомнѣнно ниже дѣйствительности. Всѣхъ больныхъ по губерніи приблизительно было 1256, изъ которыхъ выздоровѣло 878, умерло 293.

Въ уѣздахъ:

Въ Бѣлгородскомъ	бол.	576	выз.	455	ум.	121
— Щигровскомъ	—	184	—	104	—	80
— Грайворонскомъ	—	179	—	142	—	37
— Корочанскомъ	—	96	—	59	—	37
— Курскомъ	—	86	—	58	—	8
— Тимскомъ	—	70	—	60	—	10
— Фатежскомъ	—	65	—	—	—	—

Развитіе натуральной оспы всегда сопровождалось сильнымъ, лихорадочнымъ состояніемъ, съ температурой до 41 0° С. и выше, сильными гастрическими явленіями, со рвотой головными болями, сильной слабостью и болями въ членахъ, но въ особенности въ поясницѣ и крестцѣ. Появленію оспенныхъ пятенъ, на которыхъ въ послѣдствіи развивались оспины, часто предшествовала краснота кожи, въ видѣ краснухи (roseola); въ періодѣ образованія пустулъ и въ періодъ ихъ нагноенія, бредъ и безпамятство достигали высшей степени; пораженія слизистыхъ оболочекъ въ особенности зѣва рта, дыхательнаго горла и вѣтвей бывали весьма развиты. Сливная форма болѣзни (variola confluens) встрѣчалась нерѣдко; наклонность къ подтекамъ крови въ пустулахъ встрѣчалась часто, какъ въ періодѣ образованія ихъ, такъ и въ періодѣ нагноенія, отчего, при высыханіи сыпи, струпья получали черный цвѣтъ, иногда въ видѣ сплошной черной маски, покрывающихъ лицо. Изъ болѣе важныхъ комплікацій болѣзни встрѣчались воспаленія легкихъ и воспаленія оболочекъ мозга. Продолжительность болѣзни въ тяжелыхъ формахъ была отъ 3-хъ до 4-хъ, 6-ти и 8-ми недѣль; періодъ выздоровленія былъ долгій, иногда длился мѣсяцы.

Скарлатина была менѣе распространена и доброкачественнѣе прошлогодняго; по доставленнымъ свѣдѣніямъ приблизительное число больныхъ было по губерніи 409, изъ которыхъ выздоровѣло 271, умерло 42; объ участи остальныхъ свѣдѣнія недоставлены.

Въ уѣздахъ:

Въ Грайворонскомъ	бол.	144	выз.	124	ум.	20
— Тимскомъ	—	130	—	115	—	15
— Фатежскомъ	—	96	—	—	—	—
— Рыльскомъ	—	20	—	16	—	4
— Бѣлгородскомъ	—	15	—	12	—	3

Въ остальныхъ уѣздахъ количество было незначительно. Цифровой перевѣсъ больныхъ на сторонѣ легкихъ случаевъ. Болѣзнь встрѣчалась, преимущественно, въ холодныя времена года, осенью, весною и частію зимою. Кромѣ сплошной мелкой формы сыпи, встрѣчались случаи папулезной сыпи. Изъ опасныхъ