

ТРАВПОЛЫНЫЕ СЕВОБОРОТЫ

Заготовим лес для строен области!

Куряне, приезжайте на лесозаготовки в Карело-Финскую ССР

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
американские, может высеваться по всей области. Овсяница луговая — в северо-западной, центральной зонах области и, помимо, в остальных районах, за исключением крайних юго-восточных.

Я называл виды бобовых и злаковых трав, которые можно успешно возделывать в условиях нашей области, в том числе и в вашем Обоянском районе. Клевер ведь у вас хорошо идет? (тов. Бирюков: хорошо. Неплохо идут эспартер, люцерна, нежный пырей). Думаю, что и овсяница у вас пойдет.

Бобовые и злаковые травы высеваются в травосмесях. На первом этапе смеси должны быть двухлетними. Например, клевер красный с тимфеевой луговой или пыреем нежным; эспартер — пырей нежный. По мере того, как будут накапливаться семенные ресурсы, а колхозники овладевать агротехникой многолетних трав, в полевых севооборотах можно высевать и трехлетние травы: смеси, скажем, люцерны, эспартера и овсяницы луговой; клевера и овсяницы луговой; клевера и овсяницы луговой.

Очень хорошо подсеивать в люцерне со злаковыми компонентами эспартер. Это дает такие результаты: в сухие годы в травостое будет преобладать люцерна, во влажные — эспартер. Если подсеивать клевер к люцерне, это даст устойчивость бобовых в травостое.

Значит, курским колхозам, в том числе и вашему, надо быстрее вводить травы, и не в чистом виде, а в травосмесях. Только таким путем мы быстрее поднимем плодородие земли.

МЕСТО ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР В СЕВОБОРОТЕ

Итак, в травопольных полевых севооборотах должны иметь место травосмеси многолетних трав и паровые поля. Что касается однолетних сельскохозяйственных культур, то их место определяется плановым заданием с учетом природных условий, благоприятных для произрастания. Хорошо возделываются в вашем районе рожь и озимая пшеница, причем озимая пшеница по урожайности идет наравне с рожью. Яровая пшеница более капризна. Ячмень — весьма урожайная культура, но требующая ранних посевов и высокой агротехники. Просо — устойчивая в наших условиях и теплолюбивая культура. Вы возделываете сахарную свеклу, картофель, а в юго-восточных районах подсолнечник. Вот эти и есть культуры полевых севооборотов.

Как же разместить их в травопольном севообороте?

Теперь не только главному агроному, но и председателю колхоза и звеньевым хорошо известно: после трав надо размещать пшеницу, чтобы травяное поле использовало зерновой культурой, но не овсом и не ячменем, а именно пшеницей — высокоценной культурой. Следующее поле — оборот пласта. Это лучшее поле в севообороте. Оно, в зависимости от планового задания, может быть занято пропашной культурой: сахарной свеклой.

Но с другой стороны, там, где плановое задание по свекле меньше, можно еще раз разместить яровую пшеницу по яровой пшенице. Об этом записано в постановлении правительства и подтверждается нашим опытом. В травопольных севооборотах следование пшеницы по пласту и обороту пласта, т. е. два года подряд, не снижает урожай этой культуры. Наоборот, в ряде лет яровая пшеница по обороту пласта дает более высокий урожай. Затем могут идти зернобобовые культуры в качестве паразитирующих, если вводится занятый пар. Возможны другие паразитирующие культуры: картофель, гречиха и др.

Исходя из планового задания и потребности в кормах, надо определять, какая схема будет лучше, наиболее полно удовлетворяя запросам данного хозяйства.

Возьмем 10-польную схему севооборота с двумя полями озимых по парам, с двумя полями многолетних трав и одним полем пропашных. Она может быть приемлемой в условиях юго-восточной зоны области. 9-польные севообороты должны быть с двухлетним использованием трав. В тех случаях, когда ставится задача в 9-польных севооборотах иметь два поля озимых, придется размещать их так: одно по занятому пару, а другое — по черному, причем подсеивать в этой схеме возможно только под озимые. 7-польные севообороты с двумя полями озимых и одним полем пропашных возможно сконструировать лишь в том случае, когда будет одностороннее использование трав и одно из озимых полей будет идти по занятому пару, а травы будут подсеиваться под озимую пшеницу, после черного пара.

Если ограничиться одним полем озимых и одним полем пропашных, то возможно составить 7-польный севооборот с многолетним использованием трав. В отложениях 8-польного севооборота следует заметить, что при желании иметь два поля озимых неизбежно одно из них приходится размещать по занятому пару, причем здесь могут быть варианты

ты как с однолетними, так и с двухлетним использованием трав. В свеклопосевных районах, в частности в Обоянском, в особенности в колхозах, прилегающих к сахарным заводам, необходимо иметь два поля пропашных. Если этот вопрос разрешать в 10-польном севообороте, то представляется возможность решить его в такой схеме: травы, травы, яровая пшеница, пропашные, пар, занятый рожью, пропашные, яровые, пар, озимая пшеница с подсеиванием трав.

Таким образом, мы видим, что конструировать ту или иную схему севооборота надо в зависимости от конкретных условий хозяйства и от планового задания. Отрываясь от условий хозяйства схем севооборотов нет и быть не может.

Из сказанного вытекает также, что вопрос о занятых парах в условиях ряда районов Курской области является очень важным.

Академик Вильямс неоднократно указывал, что по мере того, как почвы будут очищаться от сорняков, как будет восстанавливаться их структура, мы будем переходить от черных паров к занятым парам. Но это не значит, что занятые пары надо осваивать уже сегодня, когда еще мы не перешли к правильным севооборотам. В годы перехода к ним, когда еще травяные поля не освоены, мы обязаны иметь больше черных и ранних паров, чтобы скорее и лучше очистить почву от сорняков. Мне представляется, что в процессе перехода к севооборотам, в ближайшие годы, одно из полей, которое пока не занято под травы, должно быть занято под черные пары, чтобы увеличить площадь озимых культур. Другое травяное поле может быть занято зернобобовыми культурами и однолетними травами. Зернобобовые культуры являются хорошими предшественниками под яровые, даже под яровую пшеницу. В наших опытах урожай пшеницы после зернобобовых достигал 25 центнеров. Также высокий урожай яровой пшеницы получился и после однолетних трав. В 1947 году урожай яровой пшеницы после суданки на поле среди лесных полос составил 23 центнера с гектара. Агрономом области и работником опытных станций, видимо, следует поработать над подбором паразитирующих культур и агротехники занятых паров.

Значит, курским колхозам, в том числе и вашему, надо быстрее вводить травы, и не в чистом виде, а в травосмесях. Только таким путем мы быстрее поднимем плодородие земли.

МЕСТО ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР В СЕВОБОРОТЕ

Итак, в травопольных полевых севооборотах должны иметь место травосмеси многолетних трав и паровые поля. Что касается однолетних сельскохозяйственных культур, то их место определяется плановым заданием с учетом природных условий, благоприятных для произрастания. Хорошо возделываются в вашем районе рожь и озимая пшеница, причем озимая пшеница по урожайности идет наравне с рожью. Яровая пшеница более капризна. Ячмень — весьма урожайная культура, но требующая ранних посевов и высокой агротехники. Просо — устойчивая в наших условиях и теплолюбивая культура. Вы возделываете сахарную свеклу, картофель, а в юго-восточных районах подсолнечник. Вот эти и есть культуры полевых севооборотов.

КОРМОВОЙ СЕВОБОРОТ ЗЕЛЕНый КОНВЕЙЕР И ЛАГЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА

Наряду с полевыми севооборотами, как отмечается в постановлении правительства и партии от 20 октября 1948 года, должны вводиться севообороты кормовые. Между полевыми и кормовыми севооборотами существует тесная взаимосвязь. Это значит, что плановые задания по посеву зерновых, технических, кормовых и в известной степени овощных культур должны быть полностью осуществлены в этих двух севооборотах.

Правильные кормовые севообороты являются надежным средством создания прочной кормовой базы для животноводства. Многолетние травы, высеваемые в них, представляют собой не только агротехническое средство, направленное на восстановление структуры почвы и ее прочности, но они являются и ценным кормом.

Использование многолетних трав в кормовых севооборотах, как показывает опыт, возможно в пределах четырех и даже пяти лет. Травосмеси даже на 4-м году пользования дают урожай зеленой массы не ниже, а выше, чем в третьем году пользования. Так, травосмесь — люцерна синегридная, пырей нежный и клевер безостый — в среднем за 4 лет дала в институте земледелия следующий урожай зеленой массы по годам пользования в поле среди лесных полос: в первый год — 149 цент. с гектара, во второй — 159, в третий — 112, в четвертый — 143,8.

В нашей области осадков выпадает больше, чем в Каменной степи, и травосмеси могут давать урожай до 5 лет, особенно, если пользование ими как пастбищем будет умеренным, и в первые два года трава будет скашиваться на сено.

Пренебрежение к кормовым севооборотам чревато большими неприятностями. Как организует сейчас кормовая база для животноводства в летний период? С весны скот идет на паровые поля. Урожайность паровых полей невелика — 7—10 центнеров зеленой массы с гектара. Но так как пастись скоту в поле, особенно в колхозах, не имеющих естественных пастбищ, председатели колхозов стараются как можно дольше не пахать пар. А раз пар всарается, не поднимается, снижается урожай озимых культур.

В связи с введением правильных севооборотов применяются черные пары, которые будут пахаться еще с осени. Тут вовсе исключается возможность пастбища скота по парам. Пастба по живому при условии правильной системы лубовой обработки также исключается. Волей-неволей встает такой вопрос: если мы желаем иметь продуктивное животноводство, мы должны подумать о создании кормовой базы, получая, как кормят скот в течение

летнего и зимнего периода.

Украинские колхозы уже дали ответ на этот вопрос. Они предлагают организовать так называемое стойловое лагерное содержание скота, а чтобы иметь зеленые корма — в полях кормовых севооборотов ввести так называемый зеленый конвейер.

Зеленый конвейер состоит из многолетних и однолетних трав. В зеленом конвейере высеваются озимая рожь, озимая вика, вико-овес разных сроков посева. Суданка, высеваемая не меньше трех раз в течение лета, кукуруза, высеваемая в разные сроки, греческая кабачки, кормовые арбузы. Эти культуры и должны возделываться в полевом периоде кормового севооборота, когда поля заняты под посевом многолетних трав.

Украинцы считают, что все эти культуры надо использовать не путем пастбы, а путем скармливания их в свежем виде, в стойле. Но так как в стойлах лето содержит скот тяжело, он нуждается в мочоне, то предлагается такой метод: выбирается место на естественном пастбище, там организуется лагерь. На этой небольшой площади скот гуляет, имеет проход к водопое и здесь же кормится из кормушек скашиваемой зеленой массой.

Опыт показывает, что при лагерьном содержании достигается высокая продуктивность молочного скота: свыше 4 тысяч литров молока в год на фуражную корову. А у вас сколько? (тов. Бирюков: до 1250 литров).

Разница большая. Уместно вспомнить пословицу: у коровы молоко на языке. Сколько селя, столько и молока принесла. Пастба скота по живому, по парам — способ хозяйствования, соответствующий старому уровню земледелия. Теперь, когда мы начинаем переходить к культуре земли, когда мы должны создать долговременное изобилие продуктов в стране, мы не можем этим старым способом организовывать кормовую базу животноводства. Надо создавать ее на новой основе, на основе правильных кормовых севооборотов.

В нашем колхозе «Активист» введен 5-польный кормовой севооборот примерно с таким чередованием культур: 3 года травы, затем кормовые по траве и затем овес с подсевом трав. Такой кормовой севооборот не выдерживает никакой критики. Почему?

ОДНОЛЕТНИЕ КУЛЬТУРЫ В КОРМОВОМ СЕВОБОРОТЕ

Мы представляем совершенно четко, что кормовые севообороты должны иметь не только многолетние, но и однолетние травы. Ведь в летний период многолетние травы прекращают отрастание, и если у вас в посеве нет однолетних трав, то скот пастись негде. Здесь-то и выручает набор однолетних трав тех культур, о которых мы говорили выше.

Я говорил, что многолетние травы в кормовом севообороте должны быть года четыре, не меньше. За это время создается хороший пласт, восстанавливается структура почвы, накапливается большое количество перегноя. Это богатство надо использовать. Но если после четырехлетнего пользования травами вы будете иметь только два культуры: клевер и овес с подсевом трав, вы не используете того запаса органических веществ, которые созданы в почве. Отсюда следует, что полевой период кормового севооборота должен быть не менее четырех лет, причем в состав этого полевых периодов могут входить зерновые культуры, которые хорошо используют пласт, а именно яровая пшеница, а также бахчевые, овощные листовые. По обороту пласта могут идти однолетние травы, могут и корнеплоды.

Затем должны быть культуры, под которые подсеиваются травы. Это будут яровые культуры — овес или ячмень, имея в виду, что они могут быть использованы как фураж.

Таким образом, говоря о кормовых севооборотах, мы считаем, что по длительности ротации они должны быть отнюдь не пятипольными.

В условиях Каменной степи из однолетних культур очень хорошо удается суданка, она прекрасно подсеивается скотом, неплохо также удаются мотом, вико-овсяная смесь. Просо, высеванное на зеленый корм, охотно поедается скотом. Кроме того, в состав зеленого конвейера может быть введена также и озимая рожь. Она также ранней весной, когда многолетние травы еще не успевают отрасти, а потребность в зеленом корме уже есть. В этом случае озимая рожь является самым первым кормом. Поздней осенью и однолетние, и многолетние травы прекращают отрастание, и в этот момент очень хороша озимая рожь, особенно в смеси с викой.

Если говорить о схеме чередования культур в кормовом севообороте, то ее можно представить себе так: первые два года — травы на сено, 3 трава на выпас, 4 трава на выпас, 5 яровая пшеница, 6 бахчевые, овощи, 7 однолетние травы, корнеплоды и силосные, 8 овес с подсевом трав. Если добавить еще одно поле однолетних трав, схема приобретает вид 9-польной, если добавить поле многолетних трав, то севооборот становится 10-польным.

С учетом потребности в кормах и надо определить, какой севооборот выбрать.

После всего этого должен заметить, что в нашем колхозе кормового севооборота еще нет (тов. Бирюков: выходит, что нет).

Надо также правильно выбрать культуры сочных кормов. Нужно возделывать кормовую свеклу, картофель, тыкву. Все эти культуры очень важны и ценны. Тыква — прекрасный корм, охотно поедаемый скотом, и замечательное молокогонное средство. В условиях Курской области урожаи тыквы могут быть огромными. Поэтому обязательно надо вводить эту культуру.

ТРАВОСМЕСИ В КОРМОВОМ СЕВОБОРОТЕ

В кормовых севооборотах с первого же раза высеваются травосмеси трехлетних, скажем, люцерны, пырей нежный, клевер безостый, или вместо пырея — овсяница луговая. Если к люцерне подсеивать клевер, то будет два бобовых компонента и два злаковых: смесь 4-членная. В дальнейшем смесь возделываться и пятичленной травосмесью: люцерна, клевер, пырей нежный, овсяница луговая, клевер безостый.

Общая норма высева как в полевых, так и в кормовых севооборотах в институте им. Докучаева устанавливается по количеству всхожих семян на гектаре. Это 8—10 миллионов, из них 30—40 процентов бобовых и 60 — 70 проц. злаковых. Злаковые компонентируются таким образом: для косяка не следует давать больше 30 проц., так как он старается вытеснить все другие культуры; остальные компоненты брать в одинаковых долях или отдавать предпочтение тем травам, которые лучше себя ведут при пастбищном использовании.

ОРОШАЕМЫЙ СЕВОБОРОТ

Академик Вильямс учил, что высокие и устойчивые урожаи при орошаемом земледелии можно добиться лишь при условии возделывания травосмесей злаковых и бобовых многолетних трав, так как при поливах особенно важно, чтобы почва была прочная, структурная. Поэтому ротации орошаемых севооборотов не должны быть длительными. Не следует на орошаемых участках вводить 9—10-польные севообороты. В них поля будут слишком удалены от трав, прочность почвы будет уже значительно потеряна. Ротации должны быть короткими: шести, в большинстве своем 7 и 8-польные, причем не менее, чем с двумя полями многолетних трав.

Что касается выбора культур для посева на орошаемых участках, то ими могут быть самые ценные в хозяйственном отношении и высокотребуемые к условиям произрастания. Это яровая пшеница, озимая пшеница и культуры, отзывчивые на полив. К ним относятся, прежде всего, сахарная свекла. В институте им. Докучаева сахарная свекла на орошаемом участке дала урожай 992 центнера, а без орошения — 456 центнеров. Очень хорошо отзывались на полив овощные культуры — капуста, помидоры, лук, морковь.

В севооборотах на орошаемых участках не следует иметь черное или чистое поле, так как это будет вести к распылению и запылению почвы. Но, чтобы высевать озимую пшеницу без пара, надо создать такой набор культур, по которым можно было бы посеять озимую пшеницу: ранние овощные, ранний картофель, гречиха. Такие культуры, как рожь, просо, подсолнечник, т. е. устойчивые и в жарких условиях, было бы излишне вводить на орошаемых участках.

Несколько слов о правильной организации территории землепользования.

Ни один гектар пахотнеспособных земель не должен быть использован вне севооборота. Полевые севообороты должны быть размещены на лучших полевых землях. Под кормовые севообороты, как это определено постановлением партии и правительства, отводятся в первую очередь малоплодородные земли — выгоны и пастбища, а при недостатке их — земли полевые.

Крутые склоны балок следует обнести, создать сеть придорожных полос, а в некоторых случаях залужить тра-

Что читать о севооборотах

- Акад. В. Р. Вильямс. Основы земледелия. Издательство «Курская правда», 1948 г.
- Акад. В. Р. Вильямс. Травопольные севообороты. Издание ВАСНХИЛ, 1937 г.
- Акад. В. П. Мосолов. Агротехнические основы севооборотов. Сельхозгиз, 1940 г.
- Акад. И. В. Якушкин. Севооборот и его значение в поднятии урожайности. Тема 9-я: «Агрономические беседы». Издательство «Молодая гвардия», 1948 г.
- Проф. М. Г. Чижикевич. Введение правильных севооборотов в колхозах. Сельхозгиз, 1945 г.
- П. П. Лобанов. СССР — страна мощного зернового производства. Сельхозгиз, 1947 г.
- В. С. Дмитриев. Севообороты и система земледелия. Госпланиздат, 1947 г.
- Б. Бломквист. Организация кормовых севооборотов в колхозах. Издание «Московский большевик», 1945 г.
- А. В. Крылов. Травопольная система земледелия в борьбе с засухой Воронежского обл. Издательство, 1947 г.
- В. М. Слободян. Учение Вильямса о травопольной системе земледелия. Сельхозгиз, 1948 г.
- Подъем культуры социалистического земледелия. Сборник статей под редакцией С. Ф. Демидова. Огиз, 1948 г.
- Ф. А. Войко. Зерновой совхоз «Гигант». Сельхозгиз, 1947 г.

вами. По опыту и западным создать плотины, устроить сеть водоемов. На пойменных малопродуктивных землях, где естественные травы начинают вырождаться, надо создать особый тип севооборотов — луго-кормовых и овощных. В этих севооборотах многолетние травы могут быть до шести лет.

Мы должны помнить одно: надо использовать каждый участок земли так, чтобы он приносил пользу, способствовал увеличению изобилия продуктов, поднимало благосостояние колхозников и всего нашего народа.

Товарищи Великий план передки природы был принят по инициативе товарища Сталина. Руководство этой работой взяли на себя партия и правительство. Нет никакого сомнения, что этот план будет выполнен раньше намеченных сроков. (Аплодисменты).

Тов. Бирюков: У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. С места: В лекции было сказано, что при выборе севооборота в колхозе нужно исходить из планового задания и конкретных условий. А у нас плановые задания каждый год изменяются. Значит, изменение плана должно вестись к изменению в выборе севооборотов или к ломке их. Как это согласовать?

В. П. Байко: Если мы выберем правильный севооборот, обоснуем состав культур и площадь их возделывания, если этот севооборот будет утвержден районными и областными организациями, то в дальнейшем обязательно уже планирование с учетом севооборота. Иначе нельзя. Так и ставится сейчас вопрос.

С места: Скажите об уходе за многолетними травами.

В. П. Байко: Когда травы поспели, то уход за ними несложный. Если вы имеете в виду уход за травами, которые высеяны, скажем, в полевом или кормовом севообороте и убираются на сено, то уход сводится к тому, чтобы после уборки покровной культуры немедленно были удалены пожнивные остатки, т. е. кучи соломы и половы.

При первом укосе, если уборка идет на сено, очень важно убирать так, чтобы в покосах не оставалась трава. Надо ее стрелить в валки не дальше, как на следующий день после укоса, а между этими валками сделать боронование. В это же время следует делать подкормку фосфорными и калийными удобрениями. В таком виде трава идет под зиму и переходит во второй год пользования.

С места: Какой укос лучше оставить на семена — первый или второй?

В. П. Байко: Если вы имеете дело со злаковыми травами, будь то пырей, тимфеевка, овсяница, житняк или любая злаковая трава, то они убираются на сено только с первого укоса, со второго укоса сено не получится. Из бобовых — эспартер дает сено только с первого укоса. Семена клевера можно получить и с первого, и со второго укосов. В отношении люцерны, если во времени цветения замечается, что она повреждается вредителями, то лучше срезать ее в критический срок и оставить на второй укос. Если опасности повреждения нет, то следует оставить на семена первый укос. Но тут также значение имеет погода. Первый период лета бывает влажным, а люцерна и клевер замечательно растут, что они прекрасно реагируют на воду. Чем больше воды, тем больше развивают они свою массу и плохо бутонизируют, завязывают семена. В этом случае может грозить пропастание, полегание. При такой обстановке первый укос лучше убрать на сено, второй оставить на семена. В каждом отдельном случае надо учитывать сложившуюся обстановку и характер развития трав.

С места: Бороновать ли клевер на территории Обоянского района, в нашей полосушавой полосе? Можно ли подкармливать клевер второго укоса весной и какими удобрениями?

В. П. Байко: Бороновать или не бороновать весной — на второй год пользования, — надо решать в каждом отдельном случае. Если весна сухая, следует бороновать. Лучше давать подкормку осенью, но если случится, что осенью вы ее не сделали и хотите поддержать траву, то можно подкормить и весной. Подкармливают бобовые фосфатными и калийными удобрениями.

Тов. Бирюков: Есть еще вопросы? Нет! Разрешите тогда от имени колхозников нашей артели поблагодарить Василия Парамоновича Байко за лекцию о травопольных севооборотах.

С каждым годом в Курской области все более широко развывается строительство в городе и деревне. Возникают новые заводы, отстраиваются колхозы, строятся культурно-бытовые учреждения.

Но без леса строить нельзя. Стройкам необходим лес. Совет Министров Союза ССР обязал Министерство лесной и бумажной промышленности СССР поставить Курской области, в течение 1949—1951 годов сверх установленного плана реализации сотни тысяч кубометров деловой древесины. Осуществление этого решения возложено на Министерство лесной и бумажной промышленности Карело-Финской ССР.

Совет Министров СССР обязал Курский облисполком направить в Карело-Финскую ССР рабочих, ибо весь довольно значительный объем лесозаготовок министерство должно выполнять сверх государственного плана.

На лесозаготовках в Карело-Финскую ССР рабочие едут в порядке организованного набора, с каждым заключается трудовой договор не менее чем на один год. При заключении договора рабочему выдается единовременное безвозвратное пособие в 150 рублей. Государство оплачивает стоимость переезда от места жительства до места работы, а за время нахождения в пути выдаются суточные — 10 рублей. Кроме того, оплачивается стоимость провоза багажа в пределах до 240 килограммов.

Рабочим лесозаготовок государство предоставляет ряд льгот. Например, хозяйства колхозников, трудоспособный член семьи которых заключил договор для работы на лесозаготовках не менее чем на год освобождаются от уплаты сельхозналога на срок действия трудового договора. Рабочие лесозаготовительных предприятий освобождаются от уплаты сельскохозяйственного налога с доходов сельского хозяйства на приусадебных участках в лесных поселках.

Все занятые на лесозаготовках в республике живут в специальных поселках, состоящих из общежитий для одиночек и одно-двухквартирных домов для семейных. Многие имеют свои собственные дома. Рабочие-одиночки бесплатно обеспечиваются местными коммунальными услугами. На приусадебных участках (размером от 0,5 до 0,75 гектара) лесорубы выращивают различные овощи — капусту, морковь, свеклу, огурцы и картофель. Имеющие свой скот получают сенокосные площади от одного до 2 гектаров на семью.

Рабочие поселки, как правило, электрифицированы. В них имеются клубы с киноаппаратами, библиотеками. В значительном большинстве поселков свои школы-семилетки, а в некоторых — и десятилетки. В каждом поселке находится фельдшерский или врачебный медпункт, имеются бани, магазины и столовые.

Труд рабочих на лесозаготовках механизирован. В лесах республики сейчас работают сотни электрических пил десятков специальных трелевочных тракторов, автомобильных кранов, паровозов узкой колеи, много новых автомобилей.

Вновь прибывающие рабочие общаются без отрыва от производства. Труд занятых на лесозаготовках оплачивается по специальным расценкам в соответствии с присвоенным каждому рабочему разрядом. Карело-Финская ССР отнесена к первому тарифному поясу, и поэтому

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

НЕУВАЖЕНИЕ К РАБОЧЕМУ СОБРАНИЮ

Недавно в клубе треста «Курскстрой» было назначено рабочее собрание.

В клуб пришли старые рабочие, собралось много молодежи. Всем хотелось отметить историческую дату освобождения города.

В 6 часов 30 минут секретарь партийной организации тов. Шатунов сказал председателю строительного тов. Федорову: «Ты тут команду», а сам ушел в состоянии сознания, что его миссия уже закончена.

В 7 часов 45 минут тов. Федоров начал «командовать». Открытое собрание, он, видимо, решил, что и его миссия закончена, и покинул зал.

В зале сидело больше ста рабочих и служащих, но среди них не было ни одного инженерно-

технического работника. Они соборались на совещание к управляющему трестом тов. Бирюкову.

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Федорук начал доклад. Ему пришлось выполнять две обязанности: докладывать и вести собрание.

В перерыв в зале оживленно обсуждали, будет ли обещанное кино. Наконец, т. Федорук ушел на работу. Оправившись, он сидел в кабинете управляющего. Кино так и не состоялось.

Такое неуважение руководителем к собраниям рабочих в тресте «Курскстрой» проявляется не впервые. Видно, т. Шатунов, Бирюков и Федоров забыли о своих обязанностях перед рабочим коллективом.

Д. ЕМЕЛЬЯНОВ, секретарь горкома ВЛКСМ.

ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ... В КОРИДОРЕ

Специалисты областного управления водного хозяйства усиленно трудятся над выполнением плана по орошению, строительству прудов и водоемов в Курской области. Но в каких неординарных условиях приходится выполнять эту важную работу!

В комнате, размером в 40 кв. метров, кроме 20 сотрудников водного хозяйства, помещаются 15 работников областного управления торфопредприятия. Как к тем, так и к другим приходит много посетителей, и временами бывает так тесно, что к столу невозможно подойти. Специалисты не имеют даже отдельного стола, за одним столом приходится тесниться двум-трем человекам. Целый

день беспрерывно стучат три машины.

Все это снижает производительность труда, отражается на качестве работы.

Кабинет начальника управления водного хозяйства превращен в архивный склад проектных материалов. Тут же находится те сотрудники, которым не достало места в общей комнате. И часто начальнику приходится принимать своих посетителей в коридоре.

Возникает вопрос: не пора ли создать рабочую обстановку и управление водного хозяйства? Инженеры: А. КАРПОВ, М. ПЕНЬКОВ, А. ЧУКОВ, А. СТАРОСЛБДЦЕВ.