

вычистивъ курятники и птичники и побѣливъ ихъ известкой. Затѣмъ слѣдуетъ:

1) Давать птицѣ хорошей кормъ—курамъ просо, битыя зерна пшеницы, ржи, гречихи, а гусямъ—овесъ въ смѣси съ другими зернами, кромѣ того, давать размоченный въ чистой водѣ хлѣбъ, но надо стараться, чтобы хлѣбъ въ водѣ долго не мокъ и вода не закисала.

2) Постоянно ставить птицѣ корыто съ чистой водой и воду какъ можно чаще мѣнять. Питье чистой воды изъ колодца, а не изъ лужи, является сильнымъ средствомъ въ борьбѣ съ падежомъ птицы. Въ большинствѣ случаевъ грязныя лужи и служатъ источникомъ заразы птицы, а не источникомъ для питья. И было бы очень желательно, чтобы хозяева больше обращали вниманія на питье птицы. У насъ же во многихъ мѣстахъ птицу даже и не принято поить. Птица, какъ и всякое животное, имѣетъ жажду, которую надо утолить. Отъ жажды птица перѣдко выпиваетъ даже снесенныя яйца.

3) Зарывайте поглубже въ землю дохлую птицу, а не выбрасывайте на улицу и на дворъ, иначе птица будетъ гнить, разлагаться и заражать воздухъ, а черезъ воздухъ другую птицу и даже людей.

4) Твердо помните правило: если хочешь себя уберечь отъ болѣзней и всякой бѣды,—береги отъ нихъ другого—твоего ближняго. Болѣзнь прилипчива, и переходитъ не только отъ одного животнаго къ другому, но отъ животнаго можетъ перейти и на человѣка.—Все мной сказанное относится къ мѣрамъ, предупреждающимъ падежи и различныя болѣзни вообще. Въ вопросѣ Вашемъ не указано, отъ какой болѣзни падаетъ Ваша птица. Мнѣ же извѣстно, что въ настоящее время самыми распространенными болѣзнями на куръ являются—холера куръ и дифтеритъ. Если Ваши куры и пѣтухи имѣютъ вялую принужденную походку, закрываютъ часто глаза; если ихъ потревожить, то онѣ оживляются, а затѣмъ снова становятся сонными, больше стоятъ въ углу, ничего не ѣдятъ и не пьютъ; пометъ жидкій, зеленовато-бѣлый, какъ будто мѣлъ, окрашенный въ зеленую краску и гуска обычно замарана этимъ пометомъ; если верхушка гребня черезъ нѣкоторое время синеетъ или даже чернѣетъ и птица въ 2—3 дня подыхаетъ,—то это несомнѣнно холера. Съ холерой куръ боритесь такъ: 1) Самое простое средство давать курамъ въ кормъ вмѣстѣ съ кашей толченный полевой чеснокъ. Полевой чеснокъ представляетъ сорную полевую траву и имѣется всюду въ деревняхъ подъ руками. Хорошо также влить птицѣ въ ротъ около $\frac{1}{4}$ рюмки простой водки. 2) Можно также отварить крапиву и одуванчикъ и отваръ давать пить курицѣ, или же давать салатъ, смоченный льнянымъ масломъ. 3) Самое же вѣрное средство противъ куриной холеры слѣдующее. Возьмите въ земской аптекѣ сложный настой хины 30 граммъ и салициловой кислоты 1 гр. и давите курицъ 3 раза въ день по 3—4 капли. Въ аптеку это лѣкарство выдаютъ по слѣдующему рецепту:

Rp. Tincturae.

Chinae compositi 30.0.

Acidi salicylici 1.0.

M. DS.

3 раза въ день по 3—4 капли курицѣ.

Если бы почему-либо по представленному рецепту Вамъ не выдали лѣкарства, такъ какъ рецептъ не подписанъ врачомъ, то обратитесь за подписью къ мѣстному ветеринарному врачу или земскому доктору.