

сѣва. Впрочемъ, въ отношеніи набора губернія не представляетъ однородной величины: въ уѣздахъ юго-западныхъ, Путивльскомъ, Рыльскомъ, Обоянскомъ, Суджанскомъ и Грайворонскомъ, урожай на солому получился выше средняго; въ уѣздахъ восточныхъ, Корочанскомъ, Новооскольскомъ, Старооскольскомъ и Тимскомъ, напротивъ, наблюдается ниже-средній сборъ соломы, въ остальныхъ же шести уѣздахъ соломы набрано приблизительно среднее количество.

Въ приложеніяхъ помѣщена еще одна таблица, дѣлающая распре- дѣленіе показаній объ урожаѣ ржаного зерна по высотѣ урожая. Та- блица эта можетъ служить въ цѣляхъ контроля выведенныхъ нами по- уѣздныхъ среднихъ, такъ какъ въ ней всѣ показанія по уѣзду соединены сообразно съ высотой отмѣчаемаго ими урожая въ группы такъ, чтобы разница между показаніями одной и той же группы не превышала 10 пудовъ; въ одну группу соединены показанія съ урожаемъ отъ 20—29 пуд., отъ 30 до 39, отъ 40 до 49 и т. д. Изъ сравненія числа показаній по группамъ не трудно вывести заключеніе, въ какихъ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ находится средній урожай, а затѣмъ, какъ велики и въ то же время на сколько распространены и отклоненія отъ среднихъ группъ. Выше мы видѣли, что высшимъ урожаемъ ха- рактеризуются пять юго-западныхъ уѣздовъ, за ними слѣдуютъ шесть центральныхъ и наконецъ — четыре восточныхъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ мы сопоставляемъ показанія по этимъ тремъ группамъ въ за- висимости отъ высоты урожая:

Урожай въ пудахъ.	Число показаній въ уѣздахъ:		
	югозапад- ныхъ	центральныхъ	восточ- ныхъ.
Отъ 20 до 30 пуд.	—	8	43
„ 30 „ 40 „	9	25	83
„ 40 „ 49 „	27	61	102
„ 50 „ 59 „	39	94	71
„ 60 „ 69 „	79	96	69
„ 70 „ 79 „	73	87	35
„ 80 „ 89 „	63	49	14
„ 90 „ 99 „	56	30	13
„ 100 „ 110 „	43	21	4
Свыше 110	40	2	1
	429	487	435

Изъ приведенной таблички видно, что въ югозападныхъ уѣздахъ наибольшее число показаній распределяется въ группахъ отъ 60 до 99 пуд., на которые падаетъ 63% всѣхъ показаній; въ центральныхъ уѣздахъ главные предѣлы колебаній урожая располагаются между груп- пами въ 40 и 79 пуд. съ 67% показаній, а въ восточныхъ между 30 и 69 пудами, при чемъ на эти группы падаетъ свыше $\frac{3}{4}$ всѣхъ показаній. Если бы мы вывели среднюю только изъ показаній съ пре- обладающей высотой урожая и сравнили ее съ средней изъ всѣхъ пока- заній, то эти среднія должны очень близко подходить другъ къ другу, въ противномъ случаѣ, въ правильности вывода средней изъ всѣхъ по-

120231