

следовательно, въ концѣ мая, томаты можно уже высадить въ грунтъ, давъ разстоянія 1—1½ арш. въ рядахъ и столько же между рядами. Иногда вѣсто посѣва въ парники, сѣютъ сѣмена просто въ деревянныхъ ящикахъ, поставленныхъ въ жилищѣ помѣщеніи и дѣлають первую разсадку въ другой ящикъ, сбитый также изъ досокъ.

Дальнѣйшее развитіе растенія идетъ, какъ я уже сказалъ раньше, непосредственно въ грунтъ, при чемъ наилучшими мѣстами слѣдуетъ считать южный склонъ на солнечномъ припекѣ и т. п. Обильной поливки растенія не требуютъ; отъ лишней сырости они только идутъ въ листъ и даютъ меньшее количество плодовъ.

По окончаніи роста растенія, оканчивающагося обычно цвѣточною кистью, ниже послѣдней появляются отростки, которые, переростая цвѣточную кисть, заглушаютъ ее, и такъ какъ то же самое повторяется съ вѣтками второго порядка, то полезно вырѣзывать часть развитій, а оставшіяся укорачивать настолько, чтобы на каждомъ оставалось не болѣе 2—3 плодовъ; такимъ образомъ получается хотя и меньше ихъ количествомъ, но за то они будутъ крупнѣе. Если желаютъ получить пораньше плоды, то слѣдуетъ обрѣзать вѣтки подъ первую цвѣточную кистью, которая въ противномъ случаѣ хорошихъ плодовъ не принесетъ. Такъ какъ растеніе само по себѣ не можетъ, благодаря тяжести вѣтвей, стоять прямо, то каждый кустъ необходимо подвязывать къ колу. Сборъ плодовъ производится по мѣрѣ ихъ созрѣванія, причеъ, если на кустахъ къ осени останутся еще незрѣлые плоды, то можно, снявъ ихъ, положить въ теплую комнату, гдѣ они и дозрѣютъ (конечно, на солнцѣ). Для полученія сѣмянъ отбираютъ нѣсколько зрѣлыхъ лучшихъ плодовъ, которые погружаютъ въ сосудъ съ водою, гдѣ ихъ раздавливаютъ и промываютъ до полной очистки сѣмянъ. Въ одномъ лотѣ заключается 3500 сѣмянъ, всхожесть ихъ можетъ сохраниться въ теченіе лѣтъ трехъ. Въ случаѣ, если бы мое предположеніе было ошибочно и Вамъ извѣстно различіе между баклажаномъ и томатомъ, то относительно культуры ихъ пришлось бы сказать почти то же, что было только что описано выше. Разница въ томъ, что при выращиваніи баклажанъ болѣе приходится считаться съ климатомъ, такъ какъ они болѣе требуютъ тепла, и удаленіе боковыхъ вѣтвей у баклажана является излишнимъ, такъ какъ ихъ бываетъ и безъ того мало.

Въ заключеніе отмѣчу то, что въ Корочанскомъ уѣздѣ баклажановъ сѣютъ очень мало, томатовъ же, напротивъ, довольно много.

Отвѣты Обоянскаго уѣзднаго агронома А. И. Посыпкина.

С. Котово, Бобрышевская вол., дворянину Николаю Карловичу фонъ Раммъ.

Вопросъ. Прошу, если возможно, указать, гдѣ подешевле могу купить суперфосфатъ 16⁰/₀.

Отвѣтъ. Совѣтую суперфосфатъ пріобрѣтать черезъ Московскую контору Тенте-евскаго химическаго завода. При выпискѣ цѣлыми вагонами (по 750 пуд.) цѣна 50 к. пудъ франко ст. Пушино (мѣстонахожденіе завода близъ Петербурга). Провозъ до ст. Обоини обойдется въ 12½—13 коп. съ пуда; слѣдовательно, пудъ суперфосфата Вамъ обойдется коп. 63. При заказѣ менѣе вагона цѣна назначена въ 65 коп. пудъ въ Москвѣ и до 70 коп. въ Харьковѣ, такъ что съ провозомъ пудъ обойдется Вамъ не менѣе 75—80 коп.

Если желаете выписать суперфосфатъ въ количествѣ менѣе 750 пуд., то заблаговременно обращайтесь съ заказомъ въ уѣздную управу, гдѣ суперфосфатъ можете получить по указанной цѣнѣ въ 63 коп. съ прибавленіемъ 2⁰/₀ комиссіонныхъ въ пользу склада.

С. Котово, Бобрышевской вол., крестьянину Гавріилу Федоровичу Кофанову.

Вопросъ. По раздѣлу земли мнѣ досталось около ½ дес. земли—бугоръ, неудобный для пахоты; грунтъ глинистый. Можно ли его засѣять многолѣтней травой?