

орудіями (луцильникомъ или запашникомъ). Сорныя растенія такимъ образомъ срѣзаются и запахиваются; такую пахоту приходится продѣлывать въ лѣто раза два—три такъ, чтобы поле все время было чернымъ. Если лѣтомъ будутъ выпадать дожди, то верхній слой пашни иногда послѣ нихъ ссыывается и образуетъ корку. Корка способствуетъ быстрому высыханію почвы, такъ какъ при этомъ образуются узкіе капилляры, по которымъ вода поднимается изъ нижнихъ слоевъ въ верхній, гдѣ и испаряется. Поэтому для предупрежденія образованія корки, послѣ каждаго дождя нужно поле бороновать. Такимъ образомъ проходитъ время до второй глубокой пахоты—двойки. Двойка производится за 3—4 недѣли до посѣва озимаго растенія, послѣ двоенія обработка такая же, какъ и до него, т. е. нужно поддерживать верхній слой почвы въ рыхломъ состояніи и бороться съ сорными травами. Передъ посѣвомъ пашня бороуется. Такимъ образомъ основные приемы обработки чернаго удобреннаго пара слѣдующіе: 1) непремѣнная вспашка поля осенью на всю глубину; 2) запахиваніе навоза съ осени же; 3) созданіе весной верхняго слоя пашни рыхлымъ и поддержаніе этой рыхлости во все лѣто; 4) борьба съ сорными растеніями при помощи луцильниковъ или запашниковъ; 5) двойка и обработка съ помощью бороны и луцильника по мѣрѣ появленія сорныхъ травъ и образованія корки и 6) боронованіе передъ посѣвомъ. Если обработка не можетъ быть начата съ осени, то тогда имѣешь, такъ называемый, зеленый паръ. Обработка такого пара должна быть такая же, какъ и вышеописаннаго чернаго; вся разница только въ томъ, что зеленый паръ первый разъ пахется весной, а не осенью, какъ въ черномъ парѣ. На Корочанскомъ опытномъ полѣ очень хорошіе урожаи даетъ зеленый средний удобренный паръ. Обработка его производится такимъ образомъ:

Въ маѣ вывозятъ навозъ по возможности ближе ко дню запашки, по расчету 2400 пуд. (возовъ 120) на десятину.

Послѣ вывозки немедленная раструска навоза.

Запашка навоза на $2\frac{1}{2}$ вершка въ маѣ, не позже перваго іюля.

Послѣ этого производится обработка бороною и луцильникомъ по мѣрѣ появленія сорной растительности и образованія корки; это продѣлывается до двоенія. Двойка производится на $3\frac{1}{2}$ вершка приблизительно черезъ одинъ или $1\frac{1}{2}$ мѣсяца послѣ первой запашки. Послѣ двойки немедленно вслѣдъ за плугомъ боронованіе, потомъ обработка бороною и луцильникомъ по мѣрѣ появленія сорныхъ травъ и образованія корки, и наконецъ боронованіе передъ посѣвомъ.

Новооскочанская вол., д. Стрѣльникова, Ивану Николаевичу Лыкову.

Тканіе станки-самолеты, пригодные для широкой ткани, можно получить по заказу изъ Корочанскаго земскаго склада машинъ по слѣдующей цѣнѣ:

Станокъ для тканей до 1 арш.	19 р. 50 к.
$1\frac{1}{2}$ >	21 р.
$2\frac{1}{2}$ >	29 р.

Приспособленія для станка около 6 рублей.

Новооскочанская вол., с. Кривцово, кр. Прокофію Ивановичу Кривцову.

Къ грядилю 8 и 10 дюймовыхъ плуговъ Сакка можетъ быть присоединенъ на мѣсто плужнаго корпуса цѣлый рядъ приспособленій, посредствомъ которыхъ удастся превратить плугъ въ самыя разнообразныя орудія. Цѣны на приспособленія таковы:

Трехлемный станокъ	20 р. 50 к.
Двухлемный >	15 р.
Луцильникъ	13 р.
Почвоуглубитель	6 р.
Экстирпаторъ, употребляемый для рыхленія и удаленія сорныхъ травъ	31 р.