

борьба съ горловой чахоткой считалась дѣломъ безплоднымъ, заранѣе обреченнымъ на неуспѣшность. Между тѣмъ съ тѣхъ поръ, какъ научились распознавать туберкулезъ гортани въ ранней стадіи, сообщенія врачей объ излѣченныхъ ими случаяхъ горловой чахотки попадаютъ все чаще и чаще. А если больные съ туберкулезомъ гортани перестанутъ смотрѣть на себя, какъ на обреченныхъ, и при первыхъ-же явленіяхъ болѣзни станутъ обращаться къ специалистамъ за надлежащимъ лѣченіемъ, то число исцѣленныхъ будетъ становиться еще большимъ. Нужно, однако, только помнить, что почти никогда горловая чахотка не является самостоятельной болѣзنیю, а обычно она присоединяется, какъ осложненіе легочной чахотки. Извѣстно, что среди больныхъ туберкулезомъ легкихъ одна треть заболѣваетъ и туберкулезомъ гортани. А такъ называемой первичной горловой чахотки, т. е. такого заболѣванія гортани туберкулезомъ, когда больной не болѣлъ еще легочной чахоткой, до сихъ поръ извѣстно лишь нѣсколько случаевъ. Слѣдовательно, изъ этого вытекаетъ, что, если у больного нѣтъ туберкулеза легкихъ, а почему нибудь стало больно глотать или возникъ охрипшій голосъ, то онъ меньше всего имѣетъ основаній бояться горловой чахотки. При послѣдней, правда, тоже первыми явленіями болѣзни бываетъ осипшій голосъ или хрипота, къ которымъ въ послѣдствіи присоединяются боли при глотаніи, могущія затѣмъ сдѣлаться настолько сильными, что больной не въ состояніи проглотить даже капли жидкости, напримѣръ молока. Когда болѣзнь достигаетъ уже такихъ размѣровъ, то если не прибѣгнуть къ надлежащему лѣченію специалистовъ, больной доходитъ до крайнихъ предѣловъ истощенія, онъ чахнетъ (откуда и названіе „чахотка“) и погибаетъ отъ голода. Эти явленія—осиплость голоса и хрипота вначалѣ туберкулеза гортани происходятъ оттого, что слизистая оболочка, покрывающая такъ называемыя истинныя и ложныя голосовыя связки, набухаетъ, утолщается, почему голосъ и не можетъ быть такимъ чистымъ, какъ при здоровыхъ голосовыхъ связкахъ. Въ послѣдствіи ложныя голосовыя связки становятся настолько набухшими и плотными, что могутъ возникнуть боли при глотаніи. Однако такія боли обычно происходятъ отъ того, что въ задней части гортани, (въ такъ называемомъ межчерпаловидномъ пространствѣ), на слизистой оболочкѣ возникаютъ язвы; къ этому мѣсту прилегаетъ передняя поверхность пищевода, отчего, понятно, проходящая по послѣднему пища при глотаніи надавливаетъ сзади на ту область, гдѣ расположены въ гортани изъязвленія, и вызываетъ болевые ощущенія, болѣе или менѣе сильныя. Боли при глотаніи