

шими уклоненіями въ болѣе суровую сторону къ сѣверу уѣзда и болѣе мягкую сторону къ югу уѣзда. Остановимся на вопросѣ о средних t^0 воздуха и посмотримъ, какъ онѣ колеблются для г. Курска по мѣсяцамъ (по С.).

Мѣсяцы. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сред.
Г. Курскъ $-10_1 -8_1 -3_6 4_7 13_2 17_4 19_4 18_4 12_8 6_4 -1_6 -6_6 5_2$

Такимъ образомъ, наименьшія среднія t^0 лежатъ въ январѣ и февралѣ и наивысшія въ іюлѣ и августѣ. По временамъ года среднія t^0 располагаются такъ: весна 4,76, лѣто 18,4, осень 5,86, зима 8,2; сравнивая означенныя температуры воздуха съ таковыми г. Воронежа по временамъ года, мы находимъ болѣе низкія температуры осени и весны для г. Воронежа по сравненію съ г. Курскомъ и, такимъ образомъ, климатъ послѣдняго и его уѣзда является болѣе мягкимъ, чѣмъ климатъ перваго. Смотри на карту изотермъ января для черноземной области, намъ станетъ яснымъ и понятнымъ такое явленіе: изотермы направляются не съ з. на в. въ районѣ области, а съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в. и температура понижается болѣе съ передвиженіемъ отъ з. на в., чѣмъ отъ с. на ю. Далѣе, по изотермамъ іюля мы видимъ, что лѣтнія температуры ср. воздуха направляются съ з.-ю.-з. къ в.-с.-в., благодаря чему онѣ выше для Воронежа, чѣмъ для Курска. Касаясь теперь далѣе вопроса, столь важнаго въ практическомъ отношеніи, какъ о предѣлахъ, въ которыхъ возможны колебанія t^0 какъ средних годовыхъ и мѣсячныхъ, такъ и абсолютныхъ (за 34 года).

Г. Курскъ.	Мѣсяцы.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сред. ное.
Ср. наибольшая t^0 возд. С.		-2_7	-0_1	3_2	11_8	17_7	20_6	22_2	22_1	17_4	10_0	4_3	-0_9	6_7
Ср. наименьшая t^0 .		-18_3	-14_4	-9_4	-0_3	7_9	13_6	15_3	14_0	8_3	1_6	-6_8	-15_4	3_7
Разница.		15_6	14_3	12_6	12_1	9_8	7_0	6_9	8_1	9_1	8_4	11_1	14_5	3_0

Изъ этой таблицы видно, что среднія температуры мѣсяцевъ всѣхъ, кромѣ января, не могутъ быть много ниже 0^0 , что изъ всѣхъ мѣстностей Европейской Россіи нормально наблюдается лишь въ Крыму. Съ другой стороны, средняя наименьшая t^0 января можетъ опускаться почти до 20^0 С., что рѣзко наблюдается въ остальной Европейской Россіи и представляетъ среднюю величину для января въ нижнемъ теченіи р. Оби. Наименьшія отклоненія отъ нормъ для г. Курска лѣтомъ, затѣмъ осенью, а весной и зимой эти отклоненія достигаютъ своего maximum'a.

Приведемъ теперь абсолютно наибольшія и наименьшія t^0 воздуха для г. Курска (за 20 лѣтъ).

Г. Курскъ.	Мѣсяцы.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Сред. годъ.
Maximum t^0 воздуха С.		5_6	6_8	15_6	27_1	31_5	36_4	35_6	35_9	34_6	29_1	14_9	9_4	Max. 36_4
Minimum t^0 .		-41_2	-32_0	-25_0	-18_0	-4_6	0_0	8_8	4_2	-5_6	-12_5	-30_0	-33_8	Min. -41_2
Разница		46_8	38_8	40_6	45_1	36_1	36_4	26_8	31_7	40_2	41_6	44_6	43_2	77_6