

Такимъ образомъ, колебанія въ абсолютныхъ maximum и minimum весьма значительны для г. Курска, и minimum'ы могутъ быть ниже 0° для всѣхъ мѣсяцевъ, кромѣ іюля и августа. Заморозки же, можно сказать, что могутъ встрѣчаться во всѣхъ мѣсяцахъ, кромѣ іюля, ибо наименьшій предѣлъ колебанія t° лежитъ именно въ этомъ мѣсяцѣ. Переходя теперь къ вопросу о солнечномъ сіяніи, надо отмѣтить облачность въ ‰ для г. Курска, которая колеблется по мѣсяцамъ такъ:

Г. Курскъ./Мѣсяцы.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ.
Облачность въ ‰	74	74	70	62	51	59	49	45	51	58	80	75	62

Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что наибольшая облачность бываетъ для г. Курска изъ мѣсяцевъ въ ноябрѣ, а изъ временъ года—зимой, затѣмъ весной и осенью и менѣе всего лѣтомъ. Среднее число пасмурныхъ дней для г. Курска будетъ 126 дней, или $\frac{1}{3}$ года, $\frac{2}{3}$ года же обычно принадлежитъ яснымъ днямъ. Касаясь вопросовъ относительной влажности воздуха, интересно отмѣтить, что наибольшая относительная влажность воздуха лежитъ въ ноябрѣ, затѣмъ она уменьшается медленно къ марту и быстро отъ марта къ маю, когда достигаетъ перваго minimum'a, а затѣмъ медленно повышается до сентября и быстро отъ сентября къ ноябрю; вотъ эта таблица:

Г. Курскъ./Мѣсяцы.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ.
Относит. влажн.													
возд. въ ‰	86	84	83	78	67	70	68	72	73	80	89	90	78

т. е. ходъ относительной влажности воздуха совпадаетъ съ ходомъ облачности. Увеличеніе относительной влажности въ іюнѣ объясняется наибольшимъ развитіемъ растительности, которая испаряетъ массу влаги. Паденіе относительной влажности въ іюлѣ объясняется меньшимъ испареніемъ воды главными посѣвами хлѣбновъ, которые находятся въ періодѣ созрѣванія. Курскій уѣздъ орошается въ среднемъ по даннымъ г. Курска 520 мм. осадковъ, выпадающими въ теченіе 122 дней, при чемъ maximum ихъ лежитъ въ іюнѣ и minimum въ въ февралѣ; по временамъ года осадки дифференцируются такъ (ср. за 15 лѣтъ): весна 101 мм., лѣто 204 мм., осень 126 мм. и зима 89 мм. Maximum осадковъ въ іюнѣ служитъ признакомъ юга Россіи и принадлежитъ къ нему Курскаго уѣзда. Обычно снѣгъ составляетъ для г. Курска 24—25‰ выпадающихъ осадковъ и начинается обыкновенно выпадать въ ноябрѣ; число дней, когда земля бываетъ покрыта снѣгомъ, 112. Maximum выпаденія снѣга лежитъ въ декабрѣ и въ мартѣ, а максимальная толщина его бываетъ въ февралѣ до 20 сант. По картѣ распредѣленія лѣтнихъ осадковъ въ Курскомъ уѣздѣ мы видимъ, что большее количество ихъ выпадаетъ на с. уѣзда 200—300 мм. по сравненію съ ю. частью уѣзда, гдѣ выпадаетъ 150—200 мм. Число грозъ для Курскаго уѣзда равно 21, изъ нихъ съ градомъ 3. Господствующіе вѣтры зимой преобладаютъ зимой з. румбовъ, лѣтомъ в. румбовъ. Покончивъ съ краткимъ обзоромъ климата г. Курска, характеризующаго намъ климатъ Курскаго уѣзда, и съ его естественно-историческимъ описаніемъ, мы можемъ раздѣлить на основаніи всего вышеизложеннаго Курскій уѣздъ на 2 рѣзкоразличныхъ района: сѣверный отъ р. Сейма къ сѣверу и южный отъ р. Сейма къ югу. Первый характеризуется сравнительно бѣдными лѣсостепными и лѣсными суглинками, значительно возвышеннымъ рельефомъ, материнскими породами мѣловой формаціи; въ гидрологическомъ отношеніи онъ болѣе обезпеченъ естественными водами и осадками, растительностью лѣсостепной полосы. Второй районъ характеризуется меньшими высотами, материнскими породами третичной формаціи, почвами черно-

Естественно-историческіе районы Курскаго у.