

благоприятныхъ и неблагоприятныхъ экономическихъ условий для скотоводства крестьянскихъ хозяйствъ сѣвернаго и южнаго районовъ, которые между собой довольно рѣзко различны. Первичный скотъ „горемычки-тасканки“ найденъ мною въ Курскомъ уѣздѣ въ тѣхъ стадахъ, гдѣ скотъ никогда не улучшался ни заботами земства, ни самихъ крестьянъ и единственное его назначеніе было — навозъ, получаемый для удобренія полей, а затѣмъ минимальное количество молока въ рабочую пору для хозяевъ-крестьянъ и ихъ семьи; такой скотъ былъ въ массѣ по южнымъ волостямъ, гдѣ крестьянскія хозяйства искали и нынѣ ищутъ свою опору въ производствѣ зерна, благодаря производительности черноземныхъ почвъ. Вполнѣ типичными стадами „первичнаго скота“ являются стада деревень и селъ: Высокаго, Рождественскаго, Нижн.-Касинова, Городища, Мальцева, Спасскаго, Кондратовки и Черемошного (южныхъ волостей) и Дубовца (сѣверныхъ волостей). Преобладающая масть мѣстнаго первичнаго скота будетъ краснопестрая и рыжая, масти бѣлыя, чалопѣгія, чалыя черно и сѣрокрапчатая встрѣчаются значительно рѣже. Кожа отличается тонкостью и подвижностью. Мѣстный скотъ является большею частью рогатымъ и очень рѣдко — комылымъ; голова его длинная и средняя длина ея отъ затылочнаго гребня до конца морды до 49 сант.; лицевая часть головы длинна, а лобная укорочена, первая прямая, вторая слегка вдавлена. Голова спереди представляется весьма узкой и средній ея поперечникъ между рогами равенъ 15—16 сант., между буграми верхней челюсти 16 сант., сбоку морда немного заострена, прорѣзъ рта прямой и небольшой. Уши обыкновенно средней величины покрыты длиннымъ и рѣдкимъ волосомъ, все же туловище короткими волосами. Макушечные вихры встрѣчаются рѣдко; глаза первичнаго скота большіе; рога тонкіе, средней длины 18—30 сант., по большей части бѣлые, не пигментированные по своей линіи, но съ черной пигментаціей концовъ. Шея тонкая и длинная 59—65 сант., съ боковъ сплюснутая и покрытая нѣжной и складчатой кожей; холка высокая и заостренная, плечо длинное и тощее, подгрудокъ слабо развитый, грудь не широкая, но глубокая, спина прямая, рѣже вогнутая, поясница мало выполненная; туловище съ боковъ сплюснутое и длинное; брюшная полость по большей части сѣнная. Конечности длинныя, у заднихъ въ стегнахъ мало мышцъ, скакательные суставы заострены и сближены, копыта плоскіе и пигментированы. Костякъ вообще легкій и довольно плотный. У коровъ молочные признаки выражены слабо: вымя спадливое, мягкое, чаще небольшое — квадратное съ заднимъ мелкоскладчатымъ запасомъ, соски небольшіе, обычно отвислые, широко поставленные. Молочное зеркало высокое и прямое. Долговѣчность мѣстнаго скота весьма значительна; развитіе идетъ очень медленно въ зависимости отъ плохого питанія и ранней половой жизни. Въ отношеніи экстерьера рабочаго, мясного и молочнаго скота мѣстный первичный скотъ Курскаго уѣзда нельзя причислить ни къ одному изъ названныхъ направлений: по удоиности, которую я приведу ниже, его нельзя назвать молочнымъ; на основаніи убойныхъ выходовъ Курской городской бойни при 17—19 пуд. живого вѣса — 6—8 пудовъ убойнаго его нельзя назвать мяснымъ.

Покончивъ съ описательнымъ опредѣленіемъ качествъ мѣстнаго скота, перейдемъ теперь къ примѣрамъ средне-типичныхъ мѣстныхъ коровъ и быковъ деревень, поименованныхъ выше. Для коровъ 3—10 лѣтъ примѣры наиболѣе типичны слѣд. (въ сантиметрахъ).