

Пунктъ измѣреній.	Мастъ и возрастъ.	Высота въ		Шири- на въ			Косая длина.	Обхватъ под- пруги.	Живой вѣсъ по Кюверъ- Штрауху.
		холкѣ.	крест.	Глуб. груди.	грудн. маклак.	сѣд. к.			
д. Моква I, быкъ- сим.	п.п. 5 л.	142	144	79	59	57 34	188	200	40п. 15ф.
д. Шеховцово, быкъ голл.	чер.-п. 6 л.	137	139	72	45	50 30	158	182	28п. 25ф.
д. Апальково, быкъ- сим.	п.п. 7 л.	127	129	67	49	49 25	156	168	23п. 27ф.
д. Коренскіе Дворы, быкъ-сим. . . .	кр.-п. 5 л.	127	128	67	44	44 25	160	176	26п. 20ф.

Такимъ образомъ, качество этихъ быковъ стоитъ значительно выше и земскихъ и обыкновенныхъ крестьянскихъ быковъ. Теперь остановимся на средне-типичныхъ промѣрахъ коровъ изъ стадъ Моквы и Апальково; оказывается, что экстерьеръ ихъ совпадаетъ съ данными нормъ Зетегаста для молочнаго скота; вотъ таблица, доказывающая это положеніе:

Пунктъ измѣренія.	Мастъ и возрастъ.	Высота въ		Шири- на въ			Косая длина.	Обхватъ под- пруги.	Живой вѣсъ по Кюверъ- Штрауху.
		холкѣ.	крест.	Глуб. груди.	грудн. маклак.	сѣд. к.			
д. Апальково, коро- ва сим.	5 л. п.п.	124	127	62	32	44 22	146	168	—
д. Моква, корова сим.	7 л. п.п.	124	126	67	45	47 24	148	170	—
Среднее	—	124	127	64	42	45 23	147	169	—
Въ ‰ отъ косой длины ту- ловища		85	—	40	29	31 16	100	—	—
Въ ‰ отъ косой длины по Зетегасту для мол. скота.		83	—	37	29	33 —	100	—	—

Теперь перейдемъ къ обзорѣню производительности коровъ улучшеннаго типа; по моимъ пробнымъ удоямъ, произведеннымъ въ дер. Моквѣ и Апальковѣ, оказывается, что за годъ при 280 дойныхъ дняхъ,