

Направленіе симменталовъ, полъ ж.	Возрастъ.	Высота въ			Ширина въ			Косая длина туловища.	Обхватъ въ подпр.	Живой вѣсъ по Кавверъ-Штрауху.	
		холкѣ.	крестцѣ.	Глубина груди.	груди.	маклак.	сѣд. кост.			пуд.	ф.
Мясо-раб. коровы	7 л.	132	134	73	50	52	32	158	184		
	8 л.	130	131	65	47	49	32	150	174		
Среднее	—	132	134	71	48	52	33	155	183	28	—
Мол.-мясн. коровы	5 л.	120	124	70	41	44	32	148	170		
	7 л.	125	124	70	39	49	29	156	172		
	8 л.	122	127	67	42	45	32	162	170		
	7 л.	127	129	67	40	45	32	158	172		
	6 л.	125	130	72	47	52	32	158	170		
	7 л.	129	130	70	49	54	32	160	186		
	5 л.	129	132	70	54	51	30	164	176		
	6 л.	129	132	72	49	55	30	154	188		
Среднее	—	126	129	70	46	49	31	156	178	26	12

Приравнивая средній мясоробочій типъ коровы къ нормамъ Зетегаста для рабочаго мясного скота, находимъ, что онъ вкладывается въ означенныя нормы; равнымъ образомъ, средній молочно-мясной типъ коровы вкладывается въ нормы Зетегаста для молочнаго скота (въ % отъ косой длины).

Мясо-рабоч. скоть.	Косая длина.	Высота холки.	Глубина груди.	Ширина груди.	Ширина маклака.	Молочный скоть.	Косая длина.	Высота холки.	Глубина груди.	Ширина груди.	Ширина маклака.
Средн. корова симменталь . . .	100	85	46	31	34½	Средн. корова симменталь . . .	100	81	40	29	31½
Мясо-рабоч. скоть по Зетегасту . .	100	76	42	33½	33½	Молочный скоть по Зетегасту . . .	100	83	37	29½	33½

Кромѣ промѣровъ по всему habitus'у, типъ мясоробочаго скота куда грубѣе, чѣмъ молочнаго, какъ коровъ, такъ и быковъ. Далѣе, переходя къ вопросу о количествѣ молодняка и численности стада