

дящіе до—4,6 вредять яровымъ, особенно просу и гречихѣ, огородамъ и садамъ, если застають послѣдніе на цвѣту.

Для сужденія объ атмосферныхъ осадкахъ приведемъ среднія данныя по мѣсяцамъ изъ наблюдений Семенова въ дюймахъ:

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Года.
Среднее.	0,31	0,50	0,72	1,30	2,60	2,91	2,34	2,15	1,62	1,45	1,23	0,69	17,82
Maxim.	0,58	0,51	1,76	3,15	5,43	4,92	3,39	4,92	2,86	3,5	2,74	1,27	23,79
Minim.	0,00	0,10	0,11	0,54	0,47	0,10	0,71	0,00	0,67	0,41	0,20	0,00	12,48

Для того, чтобы составить понятіе насколько равномерно ниспадаетъ это количество влаги, приводимъ данныя относительно дней съ осадками.

ЧИСЛО ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ ВЪ МѢСЯЦѢ.

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Въ году.
Среднее.	13,8	12,4	14,8	12,6	14,2	15,0	11,6	9,2	10,8	12,2	12,2	15,0	153,8
Maximum.	24	21	18	19	20	21	17	16	22	21	15	18	163
Minimum.	6	8	11	8	10	7	8	0	7	3	11	13	149

Осадки каждаго времени года имѣють для сельскохозяйственныхъ растений то или другое значеніе. Разсматривая среднія данныя, мы прежде всего видимъ, что въ зимнее время количество осадковъ незначительно, въ среднемъ за три мѣс.—1,50 дюйма, т. е. зимы здѣсь малоснѣжны и тонкій снѣжный покровъ не всегда можетъ защитить озимые посѣвы отъ вреднаго вліянія морозовъ; это дѣйствительно и наблюдается въ нѣкоторые годы на пшеницѣ и болѣе нѣжныхъ культурныхъ сортахъ ржи. Количество весеннихъ осадковъ, начиная съ марта мѣсяца, правильно возрастаетъ и достигаетъ своего maximum'a въ іюнѣ, начиная же съ іюля оно постепенно падаетъ; такое распредѣленіе влаги должно благопріятно отражаться на произрастаніи сельскохозяйственныхъ растений; выходя изъ-подъ снѣга, поля имѣють запасъ почвенной влаги, накопив-