

ями; далѣе, въ сравненіи съ 1-мъ разсмотрѣннымъ хозяйствомъ, удобреніе кладется на десятину на 500 пудовъ болѣе.

Съ значительнымъ отличіемъ въ 3-мъ клину испытывается 4-хпольный сѣвооборотъ на одномъ хуторѣ имѣнія гр. Клейнмихель (Панино, Курск. уѣзда). Въ каждомъ изъ 4-хъ клиновъ 160 десятинъ; изъ 160 десятинъ третьяго клина 60 дес. занимаются свеклой, могоаромъ на сѣно, гречихой, 100 дес. идутъ подъ выгонъ; предполагается эти 100 десятинъ также подсѣвать могоаромъ, чтобы имѣть хорошій выпасъ, но выборъ могоара для улучшенія выпаса нельзя считать удачнымъ, такъ какъ онъ поздно отростаетъ, а до того времени пускать скотъ по посѣву могоара нельзя; лучше къ озимому подсѣвать бѣлый клеверъ въ смѣси съ костромъ, но тогда будетъ расчетливѣе удлинять сѣвооборотъ и пользоваться такимъ выгономъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, а не одного. Выгоду отъ выдѣленія подъ выгонъ участка въ 3-мъ клину видятъ въ томъ, что можно дѣлать независимую обработку парового (перваго) клина, служащаго при трехпольѣ выгономъ.

Въ настоящее время взметъ пара (1-го клина) въ экономіи гр. Клейнмихель начинается со середины мая, тогда же вывозится и навозъ, но при отдѣльномъ выпасѣ ничто не мѣшаетъ дѣлать взметъ съ осени и перейти, такимъ образомъ, къ полному черному пару, имѣющему несомнѣнное значеніе для Курской губерніи; взметъ производится на 4 вершка Сакковскимъ плугомъ; навозъ запахивается тѣми же плугами на глубину 3-хъ вершковъ; двоится удобренный и неудобренный участокъ на $4\frac{1}{2}$ вершка; за плугомъ сейчасъ же поле укатывается или боронуется¹⁾.

Сѣвъ производится съ 1-хъ числахъ августа и даже съ 27—28 іюля разбросной сѣялкой и руками, сѣмена задѣлываются сохой съ бороной. Подъ картофель, гречи-

¹⁾ Неудобство такой глубокой пахоты при двоеніи указано при разсмотрѣннй обработки парового клина.