

яровая пшеница, 5) овесъ и просо; если мы обратимъ вниманіе на послѣдовательность растений въ сѣвооборотѣ, то увидимъ, что яровая пшеница отдѣляется отъ озимой лишь однимъ годомъ съ посѣвомъ бурака, ¹⁾ равнымъ образомъ послѣдніе два кліна подрядъ занимаются яровыми хлѣбами. Различной глубиной въ обработкѣ каждаго кліна это неудобство, до нѣкоторой степени, устраняется. Такъ, взметъ парины (удобренной и неудобренной), производится плугами Сакка на глубину $3\frac{1}{2}$ —4 вершковъ; двоенія парового кліна не производится, оно замѣняется многократнымъ боронованіемъ и экстирпированіемъ, смотря по состоянію поля; если послѣднія орудія не въ силахъ размельчить усохшихъ глыбъ и комьевъ, то пускается кольчатый катокъ. Подъ буракъ осенній взметъ производится на глубину 6 вершковъ; подъ яровую пшеницу, слѣдующую за буракомъ, совсѣмъ не пашется, а земля передъ посѣвомъ обрабатывается экстирпаторами; подъ овесъ и просо пашутъ на 3 вершка, слѣдовательно въ теченіе 5 лѣтъ каждому слѣдующему другъ за другомъ растенію дается слой почвы съ различной глубины. Конечно, отдать предпочтеніе тому или другому приему въ сельскомъ хозяйствѣ можно лишь послѣ ряда испытаній, тѣмъ не менѣе, принимая въ расчетъ единичныя указанія опытныхъ хозяевъ и сопоставляя ихъ съ положеніями чисто теоретическаго характера, надобно склониться скорѣе къ болѣе глубокой обработкѣ съ осени подъ яровыя нежели производить глубокій взметъ, такую же задѣлку навоза въ паровомъ кліну весною.

Въ пятипольномъ сѣвооборотѣ въ эконومیи г. Тахтамирова (въ Рубаницинѣ) и г. Гайзе (въ Лебяжьемъ), два картофельныхъ кліна; обуславливается это потребностью въ картофелѣ со стороны винокуренныхъ заводовъ въ этихъ экономіяхъ. Послѣдовательность растений

собственного же потребленія хватаетъ ржи, которая получается на водяной мельницѣ за помоль.

¹⁾ Такое мѣсто, по наблюденію г. Жекулина и г. Глуховцова, нельзя называть благопріятнымъ для яровой пшеницы, что и отзывается на ея урожаяхъ.