

и половина 8-го поля г. Евреинова), а слѣдующій годъ идетъ подъ парь; 7-мипольный сѣвооборотъ г. Ребиндеръ: 1) парь удобренный, 2) свекла, 3. а) яровое съ подсѣвамъ травы, в) масличныя, 4. а) твава, в) парь удобренный, 5. а) трава, в) озимая пшеница, 6) свекла 7. а) кукуруза, в) яровое. 6-типольный сѣвооборотъ: 1) парь удобренный, 2) свекла, 3. а) масличныя ростенія, в) картофель, 4) парь удобренный, 5. а) озимая рожь, в) свекла, 6) яровое; 7-мипольный сѣвооборотъ: 1) парь, 2) свекла, 3) яровое съ подсѣвомъ клевера, 4) клеверъ, 5) озимая пшеница, 6) свекла, 7) кукуруза и картофель; 8-мипольный сѣвооборотъ: 1) парь, 2) свекла 3) кукуруза и картофель, 4) яровое съ клеверомъ, 5) клеверъ, 6) озимая пшеница, 7) свекла, 8) яровое.

Относительно пользованія клеверомъ лишь одинъ годъ въ послѣднихъ двухъ сѣвооборотахъ г. Ребиндеръ можно сказать то же, что и относительно 5-типольнаго сѣвооборота въ Бѣломъ Колодезѣ. Кромѣ того, свекла послѣ удобреннаго пара во всякомъ случаѣ даетъ менѣе доброкачественный продуктъ, нежели въ томъ случаѣ, когда свекла слѣдуетъ вторымъ растеніемъ послѣ удобренія.

Обратимся затѣмъ къ сѣвооборотамъ въ которыхъ корнплоду отводится меньшее значеніе или даже онъ и совсѣмъ не сѣется, главное же вниманіе обращается на травы. Въ экономіи г. Волкова (Нелидовка) такой 9-ти польный сѣвооборотъ: 1) парь, 2) озимь, 3) картофель, 4) яровое съ подсѣвомъ травы, 5) 6) трава для укоса, 7) трава для выпаса и парь 8) озимое, 9) яровое.

При Кучеровской сельско-хозяйственной школѣ въ 8-ми польномъ сѣвооборотѣ такой порядокъ чередованія растений: 1) парь удобренный, 2) озимая пшеница, 3) кормовой буракъ, картофель, отчасти вика съ овсомъ и горчица, 4) овесъ съ подсѣвомъ клевера съ тимофеевкой, 5) 6) травы на укосъ, 7) трава для выпаса, 8) плосовое просо. Въ экономіи г. Моисѣева (Гнѣздилово) на хуторѣ такой сѣвооборотъ: 1) парь, 2) озимая пшеница съ подсѣвомъ клевера, 3) клеверъ на