

сорные травы, а во 2-хъ перемѣниваютъ навозъ съ верхнимъ слоемъ; позднѣе, уже ко времени озимаго посѣва, паровой клинъ перепахивается 3-хъ корпусными плугами вершка на два и сейчасъ же боронуется.

Чтобы окончить съ паровой обработкой слѣдуетъ еще сказать нѣсколько словъ о черномъ парѣ. У г. Тахтамирова (Рубанщина Судж. у.) и у г. Гейзе (Лебяжое, Курск. у.) поле идетъ въ паръ изъ подъ картофеля, слѣдовательно взрыхленнымъ еще съ осени при выборкѣ послѣдняго; въ другихъ экономіяхъ черный паръ встрѣчается очень рѣдко и при томъ въ небольшихъ размѣрахъ, такъ какъ паровой клинъ почти всюду служитъ для пастбы скота.

Какъ уже сказано выше въ экон. г. Тахтамирова картофель выбирается выдергиваніемъ руками, а оставшіеся клубни — тяпками; послѣ такой выборки поле представляетъ довольно ровную поверхность и идетъ въ такомъ видѣ въ зиму; зимой вывозится навозъ и какъ только весною сойдетъ снѣгъ—разбрасывается, еще до времени яровыхъ посѣвовъ; первое время навозъ служитъ для отѣненія почвы, но какъ только окончится яровой посѣвъ, его запахиваютъ не глубже двухъ вершковъ; дальнѣйшая обработка состоитъ исключительно въ рыхленіи верхняго слоя, для чего, смотря по состоянію поверхности поля, употребляются или бороны или экстирпаторы; такою обработкой, несмотря на продолжительныя засухи, сберегается въ почвѣ много влаги, что бываетъ видно и на глазъ если раскопать пашню, а достаточное количество влаги позволяетъ начать посѣвъ озимаго хлѣба въ началѣ августа, не дожидаясь дождя, и всходы показываются скоро. Однажды часть пара г. Тахтамировъ совсѣмъ не пахалъ, а ограничился лишь рыхленіемъ; въ теченіе лѣта поле экстирпировалось и бороновалось 7 разъ. Что такая обработка сохраняетъ влагу и обезпечиваетъ дружные ранніе всходы озимаго хлѣба, подтверждаютъ примѣры черного пара въ другихъ экономіяхъ; такъ въ экономіи г. Чупятова (Титово, Щигр. у.); ген. Струкова (Липецъ, Фатемск. у.); г. Фонъ-Рутценъ, Покров-