

чиха (г. Кабатъ, Александровка), тогда бываетъ возможно пробить междурядія раньше вихода корнеплодовъ. Разстояніе между рядами бурака оставляется въ 12 вершковъ, между отдѣльными растеніями въ ряду 4 вершка.

Въ хозяйствахъ съ посѣвами сахарной свекловицы на ея культуру обращается главное вниманіе; она опредѣляетъ, сѣвооборотъ, ради нея интенсивнѣе удобряются поля; къ свекловичнымъ плантаціямъ примѣняется болѣе тщательная обработка.

Въ отношеніи обработки земли подъ сахарную свекловицу прежде всего надо указать на постепенное углубленіе пахатнаго слоя при возвращеніи посѣвовъ бурака на одно и тоже мѣсто; углубленіе это вызывается съ одной стороны желаніемъ предоставить корнеплоду болѣе глубокій рыхлый слой, съ другой — воспользоваться преимуществами свѣжаго слоя, никогда не подвергавшагося обработкѣ; пахатный слой углубляется приблизительно на $\frac{1}{2}$ вершка при каждомъ посѣвѣ бурака, а отсюда вполне понятна та разница въ глубинѣ обработки, которая наблюдается въ хозяйствахъ съ продолжительной культурой бурака, сравнительно съ хозяйствами начавшими сѣять буракъ недавно ¹⁾.

Подъ буракъ поле идетъ или изъ-подъ травъ, или изъ-подъ озимей, а въ экономіи г. Ребиндеръ свеклосѣется и послѣ удобреннаго пара; обработка всегда безъ исключенія начинается съ осени; изъ подъ травъ поле лушится сейчасъ же послѣ ихъ уборки; считается желательнымъ полущить поле и послѣ озимыхъ но не всегда успѣваютъ это сдѣлать ²⁾. Осенній взметъ подъ буракъ дѣлается плугами на глубину 5—8 вершковъ; въ пластахъ, поле оставляется въ зиму. Такъ какъ посѣвъ бурака производится рядовою сѣялкой, то весенняя обработка имѣетъ главное назначеніе въ рых-

¹⁾ Въ экономіи г. Ребиндера въ Шебекинѣ подъ буракъ пахутъ на 8 вершковъ, въ экономіи г. Евреинова на 5 вершковъ, г. Жакулина, г. Мальцева и кн. Барятинскаго—на $4\frac{1}{2}$ вершк.

²⁾ На глазъ замѣтна бываетъ разница между участками, которые лушились и нелущеными (Эк. г. Боткина).