

Изъ поврежденій во время роста сельскохозяйст- Поврежденія
венныхъ растений прежде всего надо указать на вы- во время
мерзание озимой пшеницы весной, главнымъ образомъ роста.
на южныхъ склонахъ, о чемъ уже сказано выше,
пропавшихъ мѣстъ бываетъ иногда такъ много,
что поле сплошь пересѣвается яровымъ хлѣбомъ
1); если поврежденіе произошло куртинами, то по-
слѣднія въ большинствѣ случаевъ засѣваются просомъ.
Но отдѣльныя площади проса въ озимомъ полѣ представ-
ляютъ неудобства, такъ какъ просо поспѣваетъ много
позднѣе, живые же послѣ уборки хлѣба обыкновенно
служить подъ выпасъ скоту,—въ виду этого въ нѣкото-
рыхъ экономіяхъ 2) пропавшія куртины подсеваются
яровой пшеницей, созрѣваніе которой лишь на нѣсколько
дней отстаетъ отъ озимой; подсеянные яровой пшени-
цей десятины оставляются къ концу уборки озимаго
хлѣба, тогда яровая пшеница подоспѣваетъ и убира-
ется вмѣстѣ съ озимой; смѣшанное зерно идетъ въ про-
дажу, нисколько не обезцѣнивая партіи.

Засореніе полей повсемѣстное; въ хозяйствахъ съ
посѣвомъ корнеплодовъ въ сѣвооборотѣ сорныхъ травъ
гораздо меньше, благодаря тщательной обработкѣ и
своевременному уничтоженію сорныхъ травъ. На осно-
ваніи отзывовъ гг. хозяевъ на поляхъ главнымъ обра-
зомъ встрѣчаются слѣдующія сорныя травы: лебеда
мышей, выюнокъ, молочай, осотъ, дикая рябинка, па-
стушья сумка, одуванчикъ, хлопунникъ, дикая сурѣ-
пица, рыжикъ, дикій макъ, пырей; мышей въ нѣкоторые
годы 3) настолько засоряетъ поля, что производитъ
впечатлѣніе будто это—посѣянная трава; если онъ
появляется на просахъ вмѣстѣ съ лебедой, то стоимость
полки нерѣдко поглощаетъ выручку отъ проданнаго
зерна 4). Въ 1893 году выюнокъ въ экономіи кн. Дол-

1) Въ 1893 г. въ экон. гр. Клейнмихель (Рышково) нѣсколько дес. озимой
пшеницы сплошь совершенно пропали отъ весеннихъ морозовъ и были пере-
сеяны яровой пшеницей.

2) экономіи г. Бюцева (Корочка) и г. Бѣлявскаго (Полевое).

3) Въ 1893 г.

4) Экон. г. Кривцовой (Нижняя Медвѣдица).