

горукова настолько сильно засорилъ нѣкоторыя десятины яровой пшеницы, что по нимъ нельзя было пройти; дикая сурѣпица наблюдается по полямъ всюду; рыжикъ особенно любитъ ржаныя поля; на крестьянскихъ поляхъ его иногда бываетъ настолько много, что крестьяне на рѣшетахъ отдѣляютъ его отъ ржи и продаютъ. ¹⁾

Въ числѣ мѣръ борьбы съ сорными травами на первомъ планѣ надо поставить выпалываніе, а также чистоту посѣвнаго зерна, однако эти мѣры являются слабыми для окончательнаго искорененія сорныхъ травъ, такъ такъ сѣмена ихъ переносятся съ овраговъ, близъ лежащихъ дорогъ и межинокъ, на которые не обращается никакого вниманія.

Опустошенія со стороны вредныхъ насѣкомыхъ въ сильной степени проявляются на свекловичныхъ плантаціяхъ; едва только покажутся всходы бурака, какъ имъ начинаетъ грозить опасность со сорны блохи (*halicta*); поврежденія бываютъ столь значительны, что всходы погибаютъ сплошь на большихъ куртинахъ; этотъ врагъ потому особенно опасенъ, что при малыхъ его размѣрахъ и легкой подвижности исключаетъ всякія мѣры борьбы съ нимъ. Не окончитъ еще блоха своихъ опустошеній, какъ появляется новый врагъ — жукъ-долгоносикъ (*cleonus punctiventris*), который тоже подрядъ истребляетъ иногда значительныя площади. Противъ долгоносика примѣняется хотя и дорогая, но всетаки радикальная мѣра—это собираніе его руками, а чтобы предупредить передвиженіе жука, плантаціи окапываютъ неглубокими канавками съ отвѣсными стѣнками: жукъ сваливается въ нихъ и легко истребляется. Одновременно съ долгоносикомъ начинается свою разрушительную дѣятельность личинка озимой ночницы (*agrotis segetum*). Въ то время какъ первыя два насѣкомыя объѣдаютъ листовыя пластины, личинка *agrotis segetum* переѣдаетъ коронку свекловицы, отчего ботва падаетъ, а подземная часть погибаетъ.

¹⁾ Зорино, въ 1893 г. Медвенка Курск. у.