

вездѣ можно было наблюдать присутствіе трипсовъ, хозяева же совершенно ихъ не замѣчали.

Изъ паразитовъ растительнаго міра надо указать на ржавчину и головню; ржавчиной болѣе повреждаются озимые хлѣба—рожь и пшеница,—менѣе ячмень, овесъ; головня главнымъ образомъ вредитъ яровымъ: овсу, просу, ячменю, а также оз. пшеницѣ. Распространены эти паразитные грибки во всѣхъ 5 посѣщенныхъ уѣздахъ, и при внимательномъ наблюденіи можно было замѣтить въ истекшемъ 1893 г. какая значительная масса позднѣйшихъ побѣговъ озимой пшеницы, благодаря ржавчинѣ, не выкинула вполнѣ колоса, несмотря на благопріятныя условія роста.

Переходимъ къ разсмотрѣнію сортовъ различныхъ Сортовъ сельскохозяйственныхъ растений, культивируемыхъ въ хозяйствахъ.

Изъ сортовъ ржи воздѣлываются: альпійская, шампанская, пробштейнская, ивановская, ваза, бестегорна, планшtedская, тростниковая; посѣвовъ мѣстной русской ржи въ экономіяхъ не встрѣчено; указанные сорта представляютъ, вѣрнѣе, переродъ, такъ какъ заведены уже давно изъ сѣменныхъ русскихъ хозяйствъ; благодаря продолжительной культурѣ, они вполнѣ приспособились къ мѣстному климату; преимущества того или иного сорта передъ другими опредѣлить невозможно и уже самый фактъ продолжительности посѣвовъ всѣхъ указанныхъ сортовъ ясно говоритъ, что всѣ они вполнѣ пригодны для культуры въ Курекой губ. Въ пользу шампанской ржи приводится всюду фактъ болѣе ранняго ея созрѣванія, что удешевляетъ уборку; пробштейнская и ивановская рожь даютъ болѣе тяжелое зерно; сортъ ржи—маммуть, сѣявшійся нѣсколько лѣтъ г. Хитрово (въ Ворожбѣ), оставленъ, какъ очень толстокожій, почему не годился на пеклеванку и расцѣнивался ниже другихъ сортовъ.

Въ отношеніи выведенія урожайныхъ устойчивыхъ мѣстныхъ сортовъ ржи и пшеницы обращаетъ на себя вниманіе Шебекинская экономія г. Ребиндеръ, занявшаяся самымъ тщательнымъ отборомъ сѣмянъ и куль-