

Въ двухъ хозяйствахъ ¹⁾ встрѣченъ посѣвъ тимофески на полѣ, но сравнительно сухой климатъ Курской губ. исключаетъ возможность культуры тимофеевки на высокихъ мѣстахъ; тоже надо сказать и относительно англійскаго рейграса ²⁾, гораздо лучше удастся костеръ безостый.

Всюду травы подсеваются къ яровому хлѣбу; пробы сѣять травы по озимому хлѣбу оказались менѣе удачными, такъ какъ поля, занятые озимымъ хлѣбомъ выходятъ изъ подъ снѣга съ уплотнившейся почвой. Лишней обработки земли подъ травы не дѣлается, сѣмена или совсѣмъ не задылаваются, или задылаваются каткомъ, волокушей, бороной, а сѣмена эспарцета, какъ болѣе крупныя—даже экстирпаторомъ. Травы при посѣвѣ безъ покровнаго растенія удаются гораздо лучше ³⁾; родъ покровнаго растенія также не остается безъ вліянія, такъ, подъ прикрытіемъ овса, какъ болѣе низкорослаго растенія, травы развиваются лучше, нежели подъ яровой пшеницей ⁴⁾. По снятіи покровнаго растенія у эспарцета въ случаѣ жаркой и сухой погоды нерѣдко погибаетъ вся надземная часть, при наступлежии же дождей отъ корня идутъ новые побѣги ⁵⁾.

Ухода за травами въ большинствѣ случаяхъ не бываетъ никакого; но гдѣ на травы обращается больше вниманія, тамъ поля подъ травами боронуются или съ весны ⁶⁾ или по снятіи травы ⁷⁾. Въ экономіи г. Бѣлявскаго (Полевое) и ген. Струкова (Линець) травы удобряются; въ первой экономіи для этого служить торфяная зола, смоченная навозной жижей; разсыпается она весною передъ посѣвомъ клевера, эффектъ замѣтенъ какъ на покровномъ растеніи—яровой пшени-

¹⁾ Въ эк. г. Жекулина (Бѣлый Колодезь), и г. Волкова, (Нелидовка).

²⁾ Эк. г. Жекулина 7.

³⁾ Экон. г. Ребиндеръ (Шебекино).

⁴⁾ Эк. г. Бѣлявскаго (Полевое).

⁵⁾ Эк. г. Волкова (Нелидовка).

⁶⁾ Экон. г. Ребиндеръ г. фонъ Рутценъ (Покровское), г. Арнольди (Кучеров. Хуторъ).

⁷⁾ Экон. г. Ребиндеръ, ген. Струкова (Линець).