

самую сѣверную часть Кромскаго уѣзда, въ село Алмазово и началъ отсюда свои экскурсіи.

*Алмазово и его окрестности.*

Въ самомъ селеніи Алмазовѣ и его многочисленныхъ оврагахъ находимъ выходы сѣрой юрской глины и въ ней значительное количество сферосидерита, сопровождаемаго по обыкновенію створками раковины *Gryphaea dilatata*.

Къ югу выходы юры мы находимъ въ обѣихъ Баевкахъ, гдѣ значительное содержаніе сферосидерита въ Верхней Баевкѣ, особенно въ имѣніи г. Петрова. Къ западу въ Альшановкѣ, также прекрасные выходы юрской глины, также съ сферосидеритомъ. Слѣдовательно строеніе этой мѣстности совершенно выясняется. (См. Геолог. очеркъ Кромск. уѣзда).

Теперь обратимся нѣсколько къ сѣверу. Дорога, ведущая изъ села Алмазова на Хорошилово, пересѣкаетъ логъ и начиная отъ моста влѣво видны уже обнаженія, хотя еще весьма незначительныя. Сначала логъ совершенно заросъ и представляетъ намъ только густыя поросли различныхъ травъ, затѣмъ въ склонахъ образуются оползни, которые даютъ намъ возможность замѣтить выходы торфа чернаго цвѣта.

Выше по логу, чрезъ четверть часа ходьбы, показываются уже выходы сѣрой юрской глины, которая мѣстами покрыта прямо торфяниками, — мѣстами на глину налегаютъ мощныя толщи леса, до 4 сажень. Въ глинѣ наблюдается въ видѣ небольшихъ желваковъ сферосидеритъ, но въ незначительномъ количествѣ. Затѣмъ количество руды понемногу увеличивается, но всетаки его еще нельзя назвать достаточнымъ. Здѣсь очевидно атмосферное размываніе только еще проникло до поверхностнаго пласта юрской глины и еще не въ достаточной степени обнажило его.

Если изъ Алмазова спуститься на востокъ въ логъ, выйти къ деревнѣ Кондревой и, миновавъ ее, идти по дорогѣ къ Себякиной, то на правой рукѣ, невдалекѣ отъ послѣдней деревни, покажется верховье оврага Паниковца. Онъ весьма поучителенъ.

Сперва логъ Паниковецъ или Солодухинъ (на картѣ Палемикинъ оврагъ) имѣетъ весьма пологіе склоны и представляетъ