

сторонѣ лога, находится большое обнаженіе, въ которомъ выходятъ бѣлые, съ сѣрымъ оттѣнкомъ, глинистые мергеля, носящіе мѣстное названіе «слюнѣбы» или «слюнѣбака». Мергеля эти весьма плотны, тверды, тонкослойны и легко распадаются послойно на массу плитокъ табличекъ отъ 1 до 3 сантиметровъ толщины и отъ 2 до 10 кв. дециметровъ поверхностью. Мѣстами въ нихъ замѣчаются какъ бы слюдистыя блестки.

Мергеля эти въ влажномъ состояніи бываютъ сѣраго цвѣта, мѣстами несутъ желтыя пятна и почти никогда не содержатъ окаменѣлостей. Если встрѣчаются здѣсь какіе либо отпечатки окаменѣлостей, то они всегда желтобураго цвѣта. Преимущественно въ этихъ горизонтахъ попадаются виды р. *Inoceramus*.

Повидимому эти мергеля соотвѣтствуютъ опокѣ, т. е. надмѣловой сѣрой глинѣ, потому что въ большинствѣ случаевъ, я находилъ ихъ налегающими на мѣль.

Слѣдовательно, это верхнемѣловые мергеля и ихъ не слѣдуетъ смѣшивать съ мѣлоподобными подмѣловыми мергелями, развитыми напр. особенно сильно въ Ломовцѣ и Жерновцѣ Кромскаго у.

Выше слюнѣбы здѣсь лежитъ лесъ (въ Работьковѣ) на толщину 3—4 метровъ. Такова же и толща мергелей до 5 метровъ.

РАЗРѢЗЪ 10.

Гумусъ	0,2
Лѣсъ	4
Надм. Мергеля . . .	5
Общая толща . . .	9,2

Березовка (при истокахъ рѣки Водочы).

Село Березовка расположено вдоль большаго лога, вытянутаго прямо съ сѣвера на югъ. Здѣсь беретъ начало небольшой ручей Березка, который скоро сливается съ Водочей.

Наиболѣе интересны для насъ выходы хорошаго бѣлаго пишущаго мѣла, находящіеся въ указанномъ оврагѣ, противъ усадьбы Н. В. Васича, у водосвятнаго колодца. Здѣсь за рощей,