

Въ самой деревнѣ Печкѣ нѣтъ выходовъ; надо полагать, что тутъ мы найдемъ горизонтъ фосфоритонесныхъ песковъ.

Ниже по логу въ Ефимовкѣ, въ которой мы находимъ уже самыя истоки ручья Кремяча, мы наблюдаемъ выходы жерновиковъ, т. е. самага нижняго пласта мѣловой системы. Здѣсь жерновики находятся у самага уровня воды, а выше мы находимъ пески, съ различной окраской въ голубоватыхъ слояхъ ихъ, на лѣвомъ берегу ручья, находятся выходы фосфоритовъ, но очень незначительной толщины. Ниже по теченію Кремяча, количество жерновиковъ по немногу увеличивается и мы находимъ въ Бородинкахъ разрѣзъ (въ лѣвомъ берегу), заключающей выходы мѣловыхъ образованій; онъ заканчивается на верху мѣлоподобными мергелями; прямо на нихъ налегаетъ гумусъ, небольшой толщины. Ниже мѣловыхъ мергелей слѣдуетъ слой голубоватыхъ песковъ, подъ которыми залегаетъ фосфоритъ. Толща ихъ незначительна. Разрѣзъ этотъ имѣетъ слѣдующій видъ.

РАЗРѢЗЪ 19.

Гумусъ	0,2—0,3 м.
Мѣлоподобн. мергеля	0,7 »
Бѣлые пески	0,6 »
Фосфоритъ	0,1 »
Блѣдно-желтые пески	2,0 »
Фосфоритъ	0,2 »
Зеленовато-голубые пески	2,2 »
Жерновики на уров. воды	0,4 »
Общая толща разрѣза	6,5 метр.

Въ руслѣ ручья, между тѣмъ, тутъ же въ Бородинкахъ, замѣчаются уже незначительные куски сферосидерита.

Идя далѣе внизъ, мы находимъ въ «Волыихъ ямахъ» (дерв.) значительное содержаніе этой руды въ руслѣ; но въ берегахъ залегаетъ тотъ же жерновикъ.

Въ Городищѣ, селѣ, лежащемъ еще ниже по Кремячу, мы видимъ также значительныя толщи жерноваго песчаника, належающаго уже совершенно явственно на зеленовато-голубую