

РАЗРѢЗЪ 34.

- | | |
|--|------|
| 1. Сѣро-желтый лесъ..... | ? |
| 2. Зеленовато-сѣрая глина..... | 7' |
| 3. Мергель, плотный, мѣлоподобный,
содержащій <i>Ostrea canaliculata</i> ,
<i>Exogira haliotidea</i> и <i>Bellmnitella</i>
<i>mucronata</i> | 3,5' |
| 4. Слоистый буровато-желтый песокъ,
съ двумя прослойками фосфо-
рита, съ <i>Janira quinquecostata</i>
и <i>Exogyra haliotidea</i> | ? |

Выше села Коровина, при верховьи Тишимки, наблюдаются также выходы мергелей, а мѣстами также и фосфоритоносныхъ песковъ.

(См. «Кромскій уѣздъ» стр. 95).

Возвращаясь снова къ описанію рѣки Песочной, я позволю себѣ пропустить небольшое сельцо Моховое и обратиться прямо къ Макарову.

Макарово. Здѣсь какъ въ главномъ, такъ и боковыхъ оврагахъ, находимъ выходы громаднѣхъ плитъ жерновиковъ, разрабатывающихся мѣстными крестьянами. Въ разрѣзахъ боковыхъ крутыхъ овраговъ, выходы пластовъ фосфорита. Чтобы не повторять одинаковыхъ описаній, и имѣя гораздо лучшіе разрѣзы въ дер. Андросовой и Зориной, обращаюсь къ этимъ послѣднимъ.

Андросово. Въ большомъ оврагѣ, тянущемся съ востока на западъ и впадающемъ съ восточной стороны, съ лѣваго берега въ рѣку Песочную, у нижняго конца деревни Андросовой, мы находимъ, въ верховьи оврага, выходы ржавыхъ песчаниковъ, незначительной толщины; ниже слѣдуетъ свита бѣлыхъ и пестрыхъ слабо-цементированныхъ песчаниковъ. Наконецъ, ниже по оврагу, обнаруживаются выходы плотныхъ сѣрыхъ жерновыхъ песчаниковъ, совершенно такого же характера, какъ въ Пасерковѣ. Сверху они совершенно гладки или же, напротивъ, имѣютъ ясно — натеchnую форму. Пласты имѣютъ толщину 2,2 метра. Въ нихъ мы находимъ много хорошо сохранившихся слоевъ де-