

Слой восьмой — слабоцементированный голубой песчаник — интенсивной окраски. Въ верхнихъ слояхъ его лежитъ фосфоритъ сплошнымъ пластомъ, сливнымъ; толщиной отъ 0,27 до 0,3. (e)

Нижній слой голубаго песчаника имѣетъ небольшую твердость и представляетъ характерную столбчатую отдѣльность. (f.)

Весь этотъ разрѣзъ покрытъ сверху обвалами и осыпью, такъ какъ въ составъ слоевъ его входитъ такъ много рыхлаго матеріала. Для каждаго слоя приходилось приготовить искусственный вертикальный разрѣзъ для измѣренія.

Въ оползнѣ много мелкихъ желваковъ фосфорита и среди нихъ, внизу разрѣза, найденъ кусокъ раковины *Inoceramus Cuvieri*, довольно значительной величины, съ хорошо сохранившимся, характернымъ поперечноребристымъ замковымъ краемъ.

Если не отнести этого обломка къ зеленобурымъ пескамъ, то, повидимому, здѣсь довольно трудно разобратъся. Дѣло въ томъ, что коричнево-кофейная глина никоимъ образомъ не должна быть отнесена къ мѣловой системѣ, такъ какъ — *ни разу ниже мѣла я не встрѣчалъ прослоя глины* (въ данной мѣстности, кромѣ одного тонкаго пласта въ Рыльскѣ). Кромѣ того, совершенно такія же глины найденныя въ сосѣднихъ уѣздахъ залегаютъ вмѣстѣ съ другими пестрыми глинами и, видимо, относятся къ свитѣ пластовъ потретичной системы.

Во всякомъ случаѣ, не предрѣшая теперь этого вопроса, можно опредѣленно сказать только то, что кофейная глина должна быть отнесена къ гораздо болѣе позднимъ отложеніямъ — *послѣ-мѣловымъ*. Названіемъ *послѣ-мѣловой* я могу опредѣлить отложеніе кофейной глины *только когда нибудь послѣ отложенія бѣлаго мѣла*.

*Дер. Злыдино.* Дальше, еще выше по ручью, противъ деревни находимъ новый разрѣзъ, на лѣвомъ же берегу ручья. Здѣсь главный оврагъ прорѣзанъ еще небольшимъ боковымъ овражкомъ, и въ немъ то и находится наиболѣе ясный разрѣзъ (прил. рисун.)