

главнаго лога, находимъ верхній слой той же глины, желтовато-сѣраго цвѣта. А по произведенному мной измѣренію anerоидомъ, толща всего пласта составляетъ 23 метра (32,2 арш.).

Здѣсь, въ боковомъ оврагѣ, находимъ такой разрѣзъ.

РАЗРѢЗЪ 61.

1. Гумусъ	0,45	м.
2. Лѣсъ	2,50	»
3. Темнокофейная глина	1,70	»
4. Шоколадно-коричнев. глина	2,00	»
5. Свѣтло-желтосѣрый глей	0,5 — 0,7	»
6. Свѣтло-сѣрая слюньба мергель . .	5,0 — 5,5	»

Толща разрѣза 12,9—13 м.

Въ этомъ разрѣзѣ, конечно, обнаженъ не весь слой слюньбы, а большая часть уходитъ ниже предѣльной границы разрѣза, такъ какъ онъ взятъ при верховьи бокового овражка, дно котораго очень круто. Оврагъ въ правомъ берегу рѣки Взмута.

Далѣе, ниже по ручью, продолжаются подобные же выходы болѣе мелкіе, неправильные, покрытые осыпями, а потому незаслуживающіе описанія.

Наконецъ, невдалекѣ уже отъ Чубаровки, за отдѣльно стоящимъ въ оврагѣ кирпичнымъ заводомъ, находится въ лѣвомъ берегу большой разрѣзъ, такого вида:

РАЗРѢЗЪ 62.

1. Черноземъ	0,3	м.
2. Лѣсъ	2,0	»
3. Опока глинист.	2,5	»
4. Сѣроват. слюньба мергель.	25,0	»

Весь разрѣзъ 29,8—30 м.

Здѣсь глинистая опока рѣзко ограничена своимъ цвѣтомъ и жирно-глинистымъ характеромъ. Цвѣтъ ея охристый и ржаво-бурый; мѣстами даже ярко-красный. Вся ея толща одноцвѣтна