

0,3 метра толщины, и съ зерномъ величиной въ 0,005—0,001 м. въ поперечникѣ.

РАЗРѢЗЪ 75.

1. Гумусъ	0,8 м.
2. Перемыт. слюньбак.—труха.	0,3 »
3. Слои трухи слюньб. прослоенн. тонк. пластами	— »
4. Слои трухи прослаиваютъ толстые пласты слюньб.	— »
5. Пластовый слюньбакъ	— »

Толщина разрѣза 4 м.

Овраги по ручью Городькову между Клёсовой и Яковлев. Далѣе, по берегу, по направленію къ Клёсовой, противъ середины села Яковлева, впадаетъ очень большой оврагъ, богатый боковыми, также весьма значительными оврагами. Всѣ они замѣчательны своей глубиной, извилистостью, вѣтвями, которыми часто переплетаются между собой. Въ нихъ также находимъ крупные разрѣзы.

Здѣсь внизу, въ самомъ основаніи боковыхъ овраговъ, слѣва (отъ входа), лежитъ слой перемытаго слюньбака, толщиной въ 4—5 метровъ. Онъ покрытъ буроватой лёсовидной глиной въ 3 метра толщины.

РАЗРѢЗЪ 76.

Гумусъ (незначительн. слой)	— м.
Буроват. глина	3,0 »
Мергель—слюньбакъ	5,0 »
Вмѣстѣ	8 м.

Дальше, по правому берегу того же оврага (слѣд. влѣво отъ входа) нѣсколько вѣтвей. Идя къ верховью по такому оврагу, глубиной въ 10—12 метровъ, мы видимъ, что, при постепенномъ повышеніи дна, понемногу исчезаетъ слюньбакъ, и только одинъ свѣтло бланжевый или же палевый лёсъ, очень тонкій, занимаетъ всю тольщу разрѣза въ 13—14 метровъ высоты. Лёсъ здѣсь покрытъ грубой красно-бурой глиной, въ 0,6 м. толщины и гумуса въ 0,3 м.