

4. Голубые пески 3 м.
 5. Желтые пески 2 »
 6. Бѣлые пески съ пропластками свѣтло-бурыхъ
слоевъ песку 4 »
- Сверху толща вся покрыта лёсомъ отъ 3 до
4 метровъ мощности

Общая толща разрёза до 15 м.

Разрѣзъ этотъ, въ Воробьевскомъ оврагѣ, значительно вытянутъ въ длину, и, прерываясь мѣстами на незначительное разстояніе, вскорѣ снова повторяется въ томъ же самомъ видѣ. Чаше всего, на поворотахъ, вслѣдствіе напора воды сбоку и подмыванія, образуются оползни, которые, вмѣсто обваловъ, обусловливаютъ образованіе откосовъ, замываемыхъ затѣмъ поверхностнымъ лёсомъ.

Цуриковъ Гнилецъ, Манышино, Алексѣевское. Лежащія далѣе, къ сѣверовостоку отъ Воробьевки, Манышино, Алексѣевское и Гнилецъ Цуриковъ, занимаютъ лѣвый берегъ ручья Гнильца, и, имѣющіеся здѣсь кое-гдѣ, выходы настолько незначительны и притомъ неясны, что все это пространство остается невыясненнымъ. Высшій пунктъ этой мѣстности — снгн. Николаевскій, на юговостокъ отъ Воробьевки, мнѣ также не удалось посѣтить. Взамѣнъ этого я проѣхалъ въ сосѣдній Мало-Архангельскій уѣздъ, о которомъ на мѣстѣ, по разспросамъ, получилъ интересныя указанія.

Легастаево, Мало-Архангельскаго уѣзда. На востокъ отъ Цурикова Гнильца, при сліяніи рѣчекъ Плотички и Даймана, расположена большая деревня Легастаево, раскинувшаяся по склонамъ высокихъ и весьма крутыхъ холмовъ.

Здѣсь есть большой логъ, носящій названіе «Волчьяго верха». Въ немъ выходитъ синяя глина съ желѣзной рудой, которая, въ основѣ залеганія, несомнѣнно — сферосидеритъ, весьма плотный, стальнаго сѣраго цвѣта, съ наплывной корой, часто зернистой и бородавчатой снаружи. Но слои руды, при частыхъ смѣнахъ дѣйствія воды и воздуха, сильно окислялись и перешли въ бурый