


12. Буро-ржавый песокъ	1	0,7 м.
13. Зеленовато-сѣрый песокъ	m1,5 —	1,6 »

Высота всего разрѣза . . . 8,0—8,75 м.

Оба разрѣза очень схожи вообще, но представляют нѣ-
сколько мелкихъ интересныхъ отличій. Такъ напр. тонкій слой

типичнаго желтаго мѣла,
развитый обыкновенно
отъ 0,2 до 0,3 метра,
является не всегда и
преимущественно подле-
гается подъ опокой и
слюньбой, притомъ въ на-
горныхъ мѣстностяхъ.
Присутствіе опоки, во
второмъ (№ 113) раз-
рѣзѣ, подтверждаетъ и
здѣсь мое наведеніе. Это
указываетъ принадлеж-
ность опоки къ свитѣ мѣ-
ловыхъ образованій и
быструю послѣдователь-
ность ихъ отложенія.
Въ первомъ разрѣзѣ мы
имѣемъ только одинъ слой
фосфорита въ 0,6 м.,
подлежащій подъ сур-
кой въ 0,9 м. Во вто-
ромъ случаѣ слой фос-
форита въ 0,25 вклю-
ченъ среди двухъ слоевъ
сурки (0,6+0,6). За-
тѣмъ есть второй слой
фосфорита, толщиной въ



Раз. 112. Оврагъ Малиновецъ у с. Пойменова.

0,3. Сумма обоихъ слоевъ даетъ 0,55; т. е. мало отличается
отъ толщи фосфорита разрѣза № 112. Это указываетъ на
раздѣленіе одного слоя на два, къ верховью. То есть происходило по-