

монь, который тянется, изгибаясь вдоль меридіана. Въ нѣсколькихъ вѣтвяхъ его выходы глинист. мергеля, общей толщиной до 13 метровъ. Наибольшіе разрѣзы его обнаруживаются особенно ясно въ вѣтви, идущей на западъ. Обрывы поднимаются до 9 метровъ, а затѣмъ толща мергеля наблюдается и въ днѣ, которое имѣетъ весьма значительный уклонъ.

Здѣсь лѣса вовсе нѣтъ. Слюньбакъ прикрытъ сверху кирпично-бурой глиной, сильно плавучей, такой же, какъ въ оврагахъ подъ Орломъ. Слой этой глины отъ 4 до 5 метровъ.

РАЗРѢЗЪ 119.

1. Гумусъ	0,6	м.
2. Кирпично-бурая глина	4—5	»
3. Плотн. пластовый мергель . . .	13	»

до 18 м.

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что *Гомонь* и вообще группа *Жировскихъ* овраговъ, находится въ первомъ періодѣ своего развитія; это овраги молодые. Всѣ они очень глубоки и крайне узки, съ отвѣсными стѣнами. Дно ихъ рѣдко бываетъ шире аршина, такъ что приходится идти по тѣсному корридору, съ высокими стѣнами. А такъ какъ выше-лежащая порода чрезвычайно легко размывается, то поэтому надо ожидать, что денудация пойдётъ съ поразительной быстротой, и что куполы холмовъ, очень крутые, со временемъ сползутъ своими боками въ оврагъ, образовавъ широкіе и очень пологіе логá, съ болотистымъ грунтомъ и съ незначительнымъ уклономъ дна. А послѣ того, какъ слюньбакъ выступитъ на поверхность въ куполахъ, онъ, вслѣдствіе атмосферныхъ вліяній, быстро обратится въ труху и дастъ своеобразный покровъ изъ того же матерьяла—элювій.

Ниже Ушаковой по Большой Курицѣ уже нѣтъ хорошихъ выходовъ. Сначала, у Ершовки, заливная долина рѣки сильно расширяется, и потому рѣка бѣжитъ далеко отъ высокихъ береговъ. А ниже Малой Жировой и Покровскаго слѣдуютъ два озерка, послѣ которыхъ все теченіе Курицы сопровождается болотистою низиной.