

канъ съ водой, издаетъ сильный трескъ въ теченіи довольно продолжительнаго времени. При смачиваніи соляной кислотой сильно шипитъ и пузырится, что указываетъ уже на значительное содержаніе CO_2 . Т. е., какъ я уже приводилъ выше, — эта порода вовсе не глина, а рухлякъ. Кусокъ ея, положенный въ разведенную соляную кислоту — распадается, причемъ тонкія глинистыя частицы осѣдаютъ.

(Отношеніе къ прокаливанію и полный химическій анализъ будетъ приведенъ ниже).

Глушкова на р. Сеймѣ. При паромѣ, на правомъ берегу рѣки Сейма, тамъ, гдѣ расположена дер. Глушково, нѣсколько выше парома, находится большой обвалъ, въ которомъ ведется выборка плотнаго слюньбака, каменистаго характера. По словамъ мѣстныхъ жителей, большая плотина у крупчатки — мельницы, которая стоитъ ниже Глушковой, сложена изъ этого каменистаго слюньбака. Въ упомянутомъ разрѣзѣ Глушковой, что на берегу Сейма, на пласты слюньбака непосредственно налегаетъ растительный слой и *лѣса нѣтъ*. Этотъ фактъ является весьма поучительнымъ, въ виду того, что нѣсколько выше, въ Козлѣ, къ которой мы сейчасъ обратимся, мы находимъ *громадныя толщи лѣса*, а при берегахъ Сейма *лѣса нѣтъ*. Такъ какъ подобныя наблюденія повторяются постоянно, то ихъ можно обобщить и выразить такимъ образомъ, — лѣсъ залегаетъ мощнымъ слоемъ на мѣстностяхъ съ значительными абсолютными высотами, а къ низинамъ выклинивается.

Юрьевка на Ваблѣ. Переходя теперь къ сосѣдней рѣчкѣ Козлѣ, впадающей въ Сеймъ, обратимся сперва на сѣверъ, на самую границу, къ Юрьевкѣ. При сліяніи Вабли съ Прутомъ, (уров. 71 с.) находимъ цѣлые ряды обваловъ и разрѣзовъ, въ которыхъ обнажаются глинистыя, бѣлыя *мергеля* — *слюньбакъ*. Тоже самое находимъ и рядомъ въ Журавлинкѣ, въ Мармыжахъ и въ верховьи Козлинскаго оврага. (Перевалъ и водораздѣлъ возвышается надъ уровнемъ Верховицы, въ Журавлинкѣ почти на 94 метра или 44,05 саж.).

Деревня Козля. Козля расположена на среднемъ теченіи ручья того же имени, впадающаго у Глушковой въ Сеймъ.