

Фосфоритъ лежитъ плитой въ 25—30 сантиметровъ толщины. Корни плиты сильно развиты, въ видѣ выме-образныхъ сосулекъ; а сорочка не отдѣляется корой, но составляетъ съ плитой одну сплошную массу. Полива — коричнево-бронзоваго цвѣта; изрѣдка попадаются окаменѣлости.

Такимъ образомъ общій схематическій разрѣзъ породъ подъ Курскомъ долженъ быть представленъ въ слѣдующемъ видѣ.

РАЗРѢЗЪ 136.

1. Черноземъ	0,6—0,7 м.
2. Красно-бурая глина	2 — 3 »
3. Лѣсъ	5 — 6 »
4. Опока	2 — 2,5 »
5. Слюньбакъ	5 — 16 »
6. Желтый мѣлъ	0,7—0,8 »
7. Бѣлый мѣлъ	10 — »
8. Краснюга (не вездѣ)	1 — 2 »
9. Мѣлоподобные рухляки	2 — 3 »
10. Сурка съ зернами фосф.	1 — 2 »
11. Пески неопр. иногда нѣтъ.	— — »
12. Фосфоритъ	— 0,3 »
13. Пески	— 2 »

Приведенный разрѣзъ можетъ служить указаніемъ тѣхъ породъ-которыя могутъ быть встрѣчены нами подъ Курскомъ всѣ совмѣстно, или же нѣкоторыя выпадаютъ. Такъ напр. желтый мѣлъ мы здѣсь находимъ до 0,8 метра толщины, тогда какъ обыкновенно онъ бываетъ только въ 0,2—0,3 м., иногда же его вовсе нѣтъ. Точно также и краснюга, часто вовсе не развита, и прямо на сурку налегаютъ мѣлоподобные мергеля (особенно сильно развитые въ центральной части Кромскаго уѣзда) и чрезвычайно богатые окаменѣлостями, прекрасно сохранившимися.

Въ частности же разрѣзы подъ Курскомъ отличаются слѣдующимъ.

Разрѣзъ на Тускори у самого моста.