

Рыльскъ тянется яйцевидная впадина съ высотами въ 83 — 86 до 99 с. Средняя полоса уѣзда, на широтѣ Рыльска, имѣетъ возвышеніе въ 98—102 (у Анатольевки—на западъ—109 на пересѣч. градус. $4^{\circ}+51^{\circ}30'$). Южнѣе къ Сейму опять 92—94—98.

Но представленіе, составленное читателемъ на основаніи всего вышеизложеннаго, объ орографическомъ характерѣ уѣзда, было-бы конечно неполно, если не упомянуть о сильномъ размываніи, которое играло, повидимому, значительную роль въ почвообразованіи уѣзда. Такимъ образомъ, напримѣръ, мы имѣемъ наибольшее колебаніе высотъ 109—83, т. е. 26 с. и это на разстояніи 30 верстъ. (Никольникова — Анатольевка), что составляетъ паденіе въ 1 саж. на 577 саж. ($1/577$). Изъ этого можно было-бы заключить, что поверхность уѣзда чрезвычайно однообразна и монотонна; а это какъ разъ противно дѣйствительности. Въ особенности въ средней полосѣ уѣзда, къ западу отъ Рыльска, мы часто находимъ въ высшей степени живописныя мѣстности. Гористыя, холмистыя равнины сильно изборожжены глубокими оврагами, которые, уже на разстояніи полуверсты, часто падаютъ сажень на 20, напр. въ окрестностяхъ Дуровой, Павловки, Каменки и др. Овраги эти въ глубинѣ густо заростають дубнякомъ, съ его темной листвою, среди которой, тамъ и сямъ, рѣзко выдѣляются облысѣвшія маленькія мѣловыя горы, еще издали назойливо обращая на себя ваше вниманіе.

Такимъ образомъ, вотъ въ нѣсколькихъ словахъ выводы, касающіеся орографіи уѣзда.

1. Бѣдность значительными высотами (maximum—109).
2. Высшій пунктъ разнится отъ низшаго только на 26 саж.
3. Общіе склоны на востокъ и на югъ.
4. Богатство крутыми оврагами.
5. Сильное размываніе поверхности.
6. Рѣзкость контрастовъ высотъ—крутизна склоновъ.

Уровень рѣки Сейма, подъ Рыльскомъ, принимается въ 68,1 ¹⁾ — 68,2 саж. (Льговъ — 68,75). Такой низкій уровень воды Сейма объясняетъ намъ причину усиленнаго размыванія

1) по Тилло = 66,7.