

какъ, по общему характеру своему, пески эти чрезвычайно напоминаютъ фосфоритоносные пески. Рѣшить же вопросъ о принадлежности ихъ къ третичной или четвертичной системѣ безъ точныхъ данныхъ нельзя.

Киселевка. Капустино, при рѣкѣ Киселевкѣ (имѣніе г. Коротнева).

Значительно восточнѣе Митевки, на берегу рѣчки Киселевки, впадающей въ Сухую Амоньку лежитъ Капустино. Это—мѣстность неблагопріятная для геолога. Здѣсь размываніе шло весьма постепенно, — всѣ рѣзкости сглажены, обрывы замыты, склоны закруглены; здѣсь не овраги, а лога. Абсолютная высота мѣстности держится около 99 или 100; и только близъ Маншевки находимъ 104,7 и у верх. Чупахина 106. А сѣвернѣе у. Под-ровнаго даже 109.

Близъ Капустина наблюдается только одинъ порядочный разрѣзъ, въ которомъ сверху залегаютъ пестрые тонкослоистые сильно-песчанистые мергеля; сверху голубоватаго и желтоватаго, ниже бѣлаго и желтобураго цвѣтовъ. Они сильно вскипаютъ при пробѣ 10% сол. кислотой. Ниже ихъ лежатъ совершенно бѣлые мергеля. А еще ниже сѣрая глина. Разрѣзъ этотъ находится по ручью Колодезь, по дорогѣ съ Капустина на Сѣровку.

РАЗРѢЗЪ 144.

1. Растит. слой.....	
2. Аллювіальн. нов. глина.....	около 1 м.
3. Голубоват.песчанист.мергеля	} вмѣстѣ до 0,8 м.
4. Желтоват.....	
5. Бѣлые тонкослоистые.....	
6. Желтобурые.....	
7. Бѣлые мергеля.....	
8. Сѣрая глина.....	

Всѣ слои вмѣстѣ, съ третьяго начиная и до седьмаго включительно, составляютъ толщу едва въ 0,75 метра. Слой восьмой—сѣрая глина довольно плотная, представляетъ, повидимому, водоупорный слой.