

вся свита породъ, выходящихъ близъ Ламакина, составляетъ $94,7 - 60,7 = 34$ саж.

Изъ этихъ 34 сажень около 4—5 надо положить на лёсъ и другія, современныя аллювіальныя образованія, и около 15 сажень на мѣль (такъ какъ онъ выходитъ на высотѣ 75—77 саж.). Слѣдовательно, промежуточная толща верхнемѣловыхъ и намѣловыхъ образованій (пески и песчаники—см. ниже)—составляетъ въ Ламакиной около 15 саж.

По дорогѣ съ Ламакиной на Кулемзину (изъ Ламакина на востокъ и сѣверо-востокъ, а потомъ къ сѣверу между оврагами), въ 2—3 верстахъ отъ Кулемзиной тянется большой оврагъ, глубиной свыше 15 сажень, но въ немъ совершенно нѣтъ обваловъ, и потому только по случайнымъ пролысинамъ, бѣлѣющимъ кое-гдѣ, можно сказать, что, вѣроятно, здѣсь выходитъ или глинистый мѣль, или надмѣловой мергель (слюнѣбакъ) на высотѣ около 75—73 саж. абс.

Кулемзино на Рыль. Близъ самой Кулемзиной тянется большой оврагъ, въ обвалахъ котораго видны выходы красно-бурой глины, а ниже ея—лѣса до 3 м. толщины.

Надъ рѣкой *Рыло*, берущей здѣсь начало изъ ключей (и пробѣгающей затѣмъ чрезъ описанныя Зыковку, Коренское, Щекино и Перецалуево), среди самой деревни, въ полукругломъ обвалѣ, выходятъ только толщи перемытой лѣсовидной глины, до 5 метровъ толщины.

Изъ Кулемзиной осмотрѣна мѣстность къ востоку, до Дуровой, Павловки и Каменки. Въ этихъ промежуточныхъ оврагахъ никакихъ выходовъ нѣтъ. Только при спускѣ дороги къ Дуровой, видны въ ея обвалахъ выходы бѣлесоватой и красной щебенистой аллювіальной глины.

Рыло. Подводя итоги къ приведенному детальному описанію окрестностей *Дурова* и бассейна р. *Рыло* (села: Кулемзино, Константиновка, Стремоуховка, Зыковка - Слободка, Коренское, Щекина, Дугина и Перецалуева до Бодрова—всѣ они по *Рылу*, и затѣмъ Дурово, Казачья-Каменка, Павловка и Карькова—Каменка по Мокрой Каменкѣ до Матохиной) можно констатировать слѣдующее.