

ступы вверхъ, въ лёсовидную глину, которые вдаются въ общую ея массу. Это указываетъ во 1) на неодновременность ихъ образованія; во 2) въ виду разности характеровъ — на различіе способовъ образованія; — въ 3) на промежутокъ времени отдѣлявшій отложеніе второй отъ первой, во время котораго въ 4) произошло сильное размываніе, послѣ котораго лёсовидная глина одинаково ровно заполнила всѣ неровности подлежащей породы.

Казачья. Здѣсь же въ Казачьей есть небольшой оврагъ, внизу. Въ немъ выходитъ лёсъ на 2 м. Потомъ слой бѣлесоватой глины и красно бурая щебенистая глина донизу.

РАЗРѢЗЪ 170. (Казачья слб.—западн. кон.).

1. Растительный слой	0,4 м.
2. Лёсовидная свѣтлая сѣровато-бурая глина	2—2,5 »
3. Грубая малиново-красная глина.	2—3 »
	5 м.

РАЗРѢЗЪ 172. (Казачья слб. въ боков. овраг.).

1. Черноземъ	0,5	»
2. Лёсъ	2	»
3. Бѣловат. глина	0,2 — 0,3	»
4. Красно-бурая щебенистая глина донизу	1,5	»
	4 — 4,5 м.	

Князево на Берюгѣ. Село *Князево* раскинуто на очень высокомъ правомъ берегу рѣки Берюгъ, и окруженное значительными высотами (102—104 с.), весьма богато глубокими оврагами. Оно отдѣлено отъ Казачьей слободы только рѣкой.

Въ самомъ селѣ Князевѣ, около церкви есть оврагъ, въ которомъ у самой дороги, близъ верховья обрывы, и по лѣвой сторонѣ видно слѣдующее.

РАЗРѢЗЪ 173.

1. Черноземъ	1,5	м.
2. Бѣлесов. суглинокъ	1	»
3. Лёсъ—типичный, сѣрый неслоистый	4,5	»