

описаннаго обрыва, — выходы значительной величины желѣзистыхъ песковъ.

*Уцкая. Масловка. Овызовка. Шошино.* Въ первыхъ трехъ деревняхъ, — въ послѣдовательномъ, приведенномъ мною порядкѣ, слѣдующихъ одна за другой по Берюгу, ниже Себекина нѣтъ никакихъ выходовъ, могущихъ пролить свѣтъ на геотектонику мѣстности. Только кое-гдѣ оползни намывной глины и суглинковъ, да въ Уцкой снова показываются желѣзистые пески.

Въ *Шошиной*, лежащей на правомъ берегу, при западномъ концѣ деревни, при спускѣ дороги подъ гору, видны — здѣсь впервые — выходы *натечнаго песчаника*. Ниже по оврагу видна бѣловатая перемытая глина съ примѣсью тонкаго песку, слѣдовательно б. *суглинокъ*, напоминающая по своему характеру мѣстный ледниковый наносъ. Здѣсь же, въ этомъ маленькомъ овражкѣ найденъ. *Astragalus* К. лб. травояднаго.

Кромѣ того, еще по оврагу, на берегу ручья, выходитъ лёсъ на 4 метра толщиной.

*Мочулище.* Въ слѣдующей деревнѣ — *Мочулищѣ*, противъ деревни, въ правомъ берегу, есть небольшой оврагъ (онъ лежитъ правѣе). Въ немъ, уже при устьи его, вынесены два валуна сливнаго песчаника. Далѣе, въ глубинѣ оврага, есть разрѣзъ, въ которомъ, внизу, залегаетъ бѣлая глина — продуктъ разрушенія надмѣловыхъ рухляковъ, которые, какъ это видно выше по оврагу, имѣютъ здѣсь свои выходы. Въ срединѣ оврага, масса крупныхъ валуновъ гнейса, гранита и крупныя плиты песчаника, съ глубокими въ нихъ бороздами, указываютъ на присутствіе типичнаго ледниковаго наноса.

На слюньбакъ налегаютъ чистые бѣлые пески, на нихъ желтые и охряные. Среди песковъ залегаетъ песчаникъ. Онъ бываетъ здѣсь двухъ видовъ, — или крупно зернистаго — сахаристаго строенія, или же сливной. Толща его до 0,7 м.

Выше лежитъ бурый глинистый лёсъ, на 3 или 4 м. толщины.

Въ бѣломъ глинистомъ щебнѣ, составляющемъ здѣсь ледниковый наносъ, такъ какъ въ этомъ именно слоѣ лежатъ крупные валуны, найдено нѣсколько мѣловыхъ беллемнитовъ и круп-