

ные обломки разновидности слюньбака. Общій характеръ щебня также слюньбаковый (плотный глинистый мергель). Многія глыбы песчаника глубоко продыравлены.

РАЗРѢЗЪ (Мочулище прав.) 175.

1. Растительн. слой	0,6 м.	
2. Лѣсъ, бурый, глинистый	4 »	
3. Желтые и охряные пески		} 5—6 м.
4. Бѣлые пески, заключ. въ себѣ . .		
5. Песчаникъ (сахарист. и сливн.) . .	0,7 »	
6. Бѣлые пески		
7. Основной слюньбакъ съ беллем . .		

Внѣ разрѣза — разрушенный слюньбакъ съ беллемнитами и валунами — щебень ледниковаго образованія.

Рядомъ съ только что описаннымъ находится другой оврагъ; онъ лежитъ лѣвѣе.

Здѣсь, внизу лежитъ бѣлая глина — перемытый слюньбакъ. Выше ея — охряно-желтый песокъ; въ немъ гнѣздами залегаетъ песчаникъ. Выше слѣдуетъ бурая глина съ валунами, и еще выше сѣрый лѣсъ.

РАЗРѢЗЪ (Мочулище лѣв.) 176.

1. Черноземъ	0,3—0,4 м.
2. Лѣсъ сѣрый	2 »
3. Бурая глина съ валунами	3 »
4. Малиново-бурые пески	} 2 »
5. Малиново-красные пески	
6. Желтые, ярко-бурые и ярко-красные пески отъ 3 до	4 »
7. Песчаникъ	0,56—0,7 »
8. Охряно-желтые пески	1,5 »
9. Бѣлая глина — перемыт. слюньб. (основнаго не видно)	неопред.