

чатыми порами, — слегка щебенистый. Толща около одного метра; потомъ глубже таже порода неясно переходитъ въ зеленовато-сѣрую, пеструю песчанистую глину, перемежающуюся съ бурыми глинистыми прожилками.

РАЗРѢЗЪ 212.

1. Черноземъ	м.
2. Бѣлесоват. супесокъ	0,3—0,4 »
3. Бурая глина	0,5—0,6 »
4. Лѣсовидный рухлякъ	1 »
5. Переходная порода (4—6). — —	»
6. Зеленовато-сѣрая глина . . .	— — »

По правой сторонѣ оврага, подъ лѣсомъ, толщиной въ одинъ метръ, тянутся пески голубоватые и зеленовато-сѣрые. Верхніе слои ихъ сильно охристые. Они довольно глинисты и, на первый взглядъ, сильно напоминаютъ лѣсъ, такъ какъ весьма обильно проникнуты трубочками и корнями растеній, испещряющими ихъ во всѣхъ направленіяхъ. На протяженіи первыхъ сверху 0,5 метра они уже становятся сильно глинистыми, а чрезъ 0,7—0,8 м. переходятъ въ плотную жирную глину зеленовато-сѣраго цвѣта. Глина эта въ оползняхъ и обрывахъ обнажена на 2—2,2 метра.

РАЗРѢЗЪ 213.

1. Черноземъ	м.
2. Лѣсъ	1 »
3. Голубов. и зеленов. сѣр. пески	0,5 »
4. Тѣже пески глинистые	0,2—0,3 »
5. Зеленов. сѣрая глина	2,2 »
Всего	4 м.

Въ лѣвой сторонѣ оврага, изъ этой зеленовато-сѣрой глины выходятъ ключи чистой воды, температурой въ 12° С.

Вообще строеніе мѣстности здѣсь оказывается весьма измѣнчиво. Довольно сильно развиты современные образованія.