

2. Надмѣловой глинистый рухлякъ.

Тутъ же въ самомъ низовьи этого боковаго оврага выходитъ сѣрый известнякъ, имѣющій паденіе къ СЗ.

6) Въ противулежащемъ на лѣвомъ берегу боковомъ оврагѣ, сначала при входѣ видна только одна бурая глина.

Выше по оврагу виденъ чистый лёсъ буроватаго цвѣта, толщиной отъ 8 до 10 метровъ; стѣны его вертикальны, размываніе сильное.

Пластовый глинистый рухлякъ на 2 м., сверху лежитъ слой разрушеннаго рухляка 1—1,5 м.

Выше по оврагу, при самомъ верховьи, куполообразный выходъ слюньбака въ 4,5 м. высоты. Этотъ куполь указываетъ, что слюньбакъ здѣсь составлялъ общую значительную толщу, но затѣмъ былъ сильно размытъ. Здѣсь обычныхъ ему *Jnosagam'ovъ* не встрѣчается.

РАЗРѢЗЪ 229. (Высоты 118—119 с.).

1. Растительный слой	— м.
2. Лёсъ до	10 »
3. Разрушенный слюньбакъ	1,5 »
4. Пластовый глинистый мергель . .	4,5 »

16 м.

Раньше, къ западу, въ мѣстностяхъ абсолютно низшихъ, около Бяковой вовсе не было лёса. Дальше восточнѣе, встрѣчается уже лёсъ, но не было значительныхъ его толщъ; наконецъ здѣсь, у *Рычицы*, гдѣ подходит *возвышенная гряда въ 120 с.*, толща лёса *достигаетъ* уже 10 метровъ. Слѣдовательно, здѣсь высоты значительнымъ образомъ зависятъ отъ большаго или меньшаго развитія лёса.

Кошкоданово, Ревное, Власово. Кромѣ описанныхъ выше мѣстъ, я проѣхалъ еще на Кошкодановскіе овр., къ Ревному, Власовой. Въ Ревномъ широкій логъ, замытый и безъ выходовъ. У *Власовой* тоже проходитъ логъ, въ верховьяхъ котораго выходитъ бурая глина, и кромѣ этого выходовъ нѣтъ.