

расщелинахъ, выходы лёса до 3 м. высоты. Вскорѣ внизу появляется слюньбакъ на 0,25 м.

Лёсъ здѣсь встрѣчается только въ новыхъ разрѣзахъ въ первичныхъ берегахъ (т. е. въ непромытыхъ при первомъ размываніи мѣстахъ, которые вновь промыты при современномъ размываніи). Тамъ же, гдѣ промоины проходятъ только чрезъ отложившіеся въ оврагѣ наносы, они прорѣзаютъ бурую и красно-бурую глину — ясное доказательство ея позднѣйшаго отложенія. Лёсъ выходитъ, конечно, въ видѣ, отвѣсныхъ стѣнъ различной высоты. А ниже по оврагу, гдѣ вторичныя образованія выходятъ ближе къ основанію оврага, лежитъ на всю толщу до десяти метровъ красно-бурая оплывающая глина, очень жирная сама по себѣ, но заключающая довольно многочисленныя примѣси. Богатство ея различными минеральными солями здѣсь особенно ясно подтверждается роскошнымъ на ней развитіемъ пунцоваго клевера.

РАЗРѢЗЪ 247.

При верховьи оврага.

Лёсъ (безъ обознач. толщи).

РАЗРѢЗЪ 247 (bis).

По тому же оврагу у низовья.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Красно-бурая глина до | 10 м. |
| 2. Слюньбакъ (надмѣловой) | 1 » |

Съ правой стороны оврага, внизу, являются выходы пластового слюньбака на одинъ метръ толщины. Еще ниже, въ правомъ берегу опять наблюдаются выходы слюньбака изжелто-зеленовато-сѣраго цвѣта на 0,7 м. толщиною съ пропластками сѣраго глинистаго песку на 0,07 толщины. Дальше, еще ниже, слѣдуютъ уже вполнѣ непрерывные выходы того же слюньбака, на который налегаетъ здѣсь зеленовато-сѣрая слоевцовая глина, не содержащая никакихъ остатковъ. Далѣе — к низу пластовой слюньбакъ принимаетъ изжелта зеленовато-сѣрый цвѣтъ, а налегающая глина ясный голубовато-сѣрый. Глина эта (опока) гладкая, ровная и пластичная, вмѣстѣ съ тѣмъ пластинчата содержитъ