

9. Голубовато-сѣрая глина — составляющая простое видоизмѣненіе предшествующей. Эта уже вполне пластичная глина жирная и вязкая	0,4 м.
10. Таже голубовато-сѣрая жирная глина, но въ нижнихъ частяхъ ложки наблюдаются уже признаки песчанистыхъ включеній	0,4 »
11. Голубая чистая глина, съ синими гнѣздовинами и прожилками; книзу она становится все плотнѣе	0,4 »
12. Голубая и синяя плотн. глины	0,4 »
13. Голѣбая плотная, а внизу синяя очень плотная глина	0,4 »

Вся глубина = 4,6 м.

Общій порядокъ наслоеній пройденныхъ при этомъ буреніи, будетъ слѣдующій.

Ложки.	Породы.	Толщи.
1.	1. Черноземъ	} 0,3 м.
	2. Рыжев. глина	
2—7.	3. Шеколадн. глина слегка песчанистая, съ голубоватыми прожилками	1,5 »
7 и 8.	4. Голубовато-шеколадная глина бол. пластичная	0,8 »
9 и 10.	5. Чистая и весьма пластичная голубовато-сѣрая глина	0,8 »
11, 12 и 13 ^{1/2} .	6. Чистая, голубая и синяя пластичныя глины, непройденныя до конца	1,2 »
		4,6 м.

Какъ видно изъ этого общаго обзора пройденныхъ породъ, всѣ они, начиная съ 3 слоя, представляютъ постепенныя видоизмѣненія и переходы. По мѣрѣ углубленія слоевъ, они все болѣе