

Голубов. сѣрыя гл.	} Плотныя жирныя.
Зеленыя гл.	
Желтыя и бурья гл.	
Въ нихъ бурый желѣзнякъ.	

До 15 м.

Подъ торфомъ, между Болотовой и Мезенки, въ небольшомъ боковомъ оврагѣ, съ крутыми расщелинами выходятъ сѣро-голубыя глины на толщину до 1 метра — (въ правомъ берегу).

Лебедка по рѣкѣ Цону. (Имѣніе, бывшее Цурикова, теперь Пущина). Лебедка лежитъ на правомъ возвышенномъ берегу р. Цона, не далеко отъ станціи желѣзной дороги Нарышкиной.

Лебедка по Цону. Съ юга прилегаетъ возвышенная, холмистая изрытая оврагами мѣстность, по которой тянется Орловско-Карачевскій большакъ. Почти у самой Лебедки имѣемъ высоту 113,2. Къ сѣверу и СВ. лежитъ низменная равнина р. Цонъ, лѣвый берегъ которой поднимается постепенно въ гору, и у желѣзной дороги достигаетъ высоты 112 сажень. Восточнѣе, у Богдановой, — большаго села на рѣкѣ, лежатъ высоты 115,6.

Въ Лебедкѣ, къ сѣверу отъ нея (по направленію къ желѣзной дорогѣ, за дубовымъ лѣсомъ), въ глубинѣ мелкаго березоваго лѣса, около 4 или 4,5 верстъ отъ церкви, сдѣланы развѣдки на желѣзную руду г. Цуриковымъ¹⁾. Нѣсколько большихъ канавъ вырыто въ различныхъ направленіяхъ, и среди нихъ одна магистральная. Кромѣ того, въ различныхъ мѣстахъ заложены колодцы (около 20) и биты шурфы. Во многихъ мѣстахъ выбрана руда — сферосидеритъ; плотная разновидность, темно-сѣраго цвѣта, мелко-зернистаго сложенія; изломъ напоминаетъ сильно изломъ сѣраго чугуна, — поэтому можно судить о слабой его глинистости. Удѣльной вѣсъ весьма значительный.

1) Подробн. см. II ч.