

РАЗРѢЗЪ 296.

1. Растит. слой	— м.
2. Лѣсъ песчанист. свѣтл., съ прожилками перемытаго слюнбака, съ окаменѣлостями	2 »
3. Фосфоритъ	— »
4. Пески — прослой тонкій	— »
5. Фосфоритъ	— »
6. Голубовато-сѣрые пески	2 »

Итакъ, это опять выходы нашей ниже-мѣловой системы.

Тамъ, гдѣ выборка глины въ лѣвомъ берегу, подъ заводомъ, можно замѣтить, что въ щебенисто-мергелистомъ слоѣ, покрывающемъ черную глину, содержатся также иголки гипса.

Рядомъ же, противъ кирпичныхъ заводовъ, слѣдуетъ большой обрывъ, въ которомъ мы видимъ слѣдующую свиту пластовъ.

РАЗРѢЗЪ 297.

1. Черноземъ	0,2—0,3 м.
2. Буро-сѣрый суглинокъ	2,5 »
3. Свѣтло-сѣрый глинист. прослой	0,4 »
4. Лѣсовидный суглинокъ	3 »
5. Сѣро-голубоватые пески	3 »
6. Темно-сѣрые пески	3 »
7. Черные пески	1,5 »
8. Черная глина	1 »

Здѣсь въ ней находятся нерѣдко аммониты изъ рода *Naploceras*? Всѣ небольшой величины и им. плоскую остро-килевую форму.

Выше того показываются въ берегахъ ручья снова черныя или же сизо-сѣрыя темныя глины съ сферосидеритомъ. Глыбы его становятся все больше и тяжелѣе, а пластовый характеръ зале-