

Несмотря на это, я собралъ нѣкоторый матерьялъ, касающійся указанной части рѣки Десны; въ этомъ районѣ, по литературнымъ даннымъ, не проѣзжалъ еще ни одинъ геологъ. Г. Романовскій и Гельмерсенъ слѣдили Десну сѣвернѣе Брянска, а Б. Армашевскій, Бледе, Борисякъ Роговичъ и др. южнѣе Трубчевска, преимущественно у Новгорода Сѣверскаго.

Приступаю къ описанію разрѣзовъ.

Ниже города Брянска, въ *Корочижѣ*, по правой сторонѣ оврага, находятся двѣ печи для выжиганія *извести изъ мѣла*. Въ обвалахъ тутъ мы видимъ выходы, ниже *мѣла*, — мергеля, налегающаго на сѣроватые пески, съ двумя бурыми прожилками, — *фосфоритъ*. Песокъ тонкій. Мергель обыкновеннаго характера, свѣтло-сѣраго цвѣта. Ниже *Тимановки* находятся выходы бѣлаго мѣла, наверху въ горѣ. А подъ самымъ *Брянскомъ* эти выходы скрыты подъ обвалами. Южнѣе *Тимановки*, на громадной горѣ — выдающейся въ видѣ утеса надъ рѣкой, возвышаясь до 122 с., находится *Свенскій монастырь*. У самаго монастыря въ береговомъ обрывѣ находимъ, покрытые оползнями, выходы бѣлаго мѣла, до 5 саж. высоты.

Еще ниже Свенскаго м., у деревни *Супониной* находятся совершенно ясные выходы сѣрыхъ *фосфоритоносныхъ песковъ*; желваки его называются здѣсь *шкварками*. Въ песокѣ встрѣчаются бурья прожилки — это тотъ же песокъ, окрашенный водной окисью желѣза. Пластовъ фосфорита нѣтъ, но куски его разсѣяны въ породѣ.

*Село Добрунь* находится на прямомъ разстояніи всего 10 верстъ отъ Брянска.

Въ овражкѣ выше Добруни, находимъ опять выходы *фосфоритоносныхъ песковъ*, сѣровато-голубаго цвѣта. Выше песковъ лежитъ бѣлый мѣло-подобный мергель съ окаменѣлостями; именно раковины *Ostrea canaliculata*. Sw.

Въ самомъ селѣ *Добруни* находятся въ горахъ ломки *бѣлаго мѣла*. Въ мѣлу, въ верхнихъ пластахъ его, подъ сѣроватою глинистой слюньбой, лежитъ слой *съ кремнями*. Потомъ, ниже слѣ-