

На берегу, тамъ же, въ самомъ низу, выходитъ темная сизовато-зеленая опока (сильно-глинистый мергель). На нее налегаютъ кварцевые пески, отдѣленные слоемъ въ 2 — 3 децм. въ видѣ наноса изъ подлежащей породы. Пески бѣлые, тонко-слоистые, струистые. Они легко стекаютъ внизъ. Кое-гдѣ въ нихъ можно намѣтить зернышки полевого шпата бѣлаго цвѣта; величина этихъ зеренъ около 1 миллиметр.; кромѣ того кусочки мергеля (слюньбака) въ 0,03—0,04 м. Мѣстами видны прослой слабаго ржаваго песчаника; кверху слои такихъ прослоевъ принимаютъ зеленовато-желтую окраску и потомъ, на верху, на высотѣ 20 метр. прослойки становятся чаще и снова принимаютъ охряную окраску. Общая толща около 28 метровъ. Окаменѣлостей ни въ одномъ слоѣ нѣтъ.

РАЗРѢЗЪ 309.

1. Покровный слой (неясн.).....	
2. Бѣлые кварцевые пески съ прослоями ржав. песчаника.....	6—7 м.
3. Бѣл. пески чистые.....	} 15—16 »
4. Бѣл. пески съ слабымъ песчаникомъ;—зеленов. желтые п.	
5. Бѣл. пески съ ржав. песчаник.	
6. Чистые текучіе бѣл. пески.....	2—2,5 »
7. Перемытая опока.....	0,2—0,3 »
8. Зеленов. сизая опока темной окраски.....	до низу.
Всего.....	28 метр.

Все покрывается здѣсь также лёсовымъ слоемъ, заключающимъ въ себѣ остатки животныхъ. Такъ мной найденъ въ нижнихъ слояхъ лёса зубъ *Elephas primigenius*, очевидно еще молодого экземпляра.

Начиная отсюда, мы имѣемъ совершенно подобные выходы слоистыхъ песковъ вплоть до самаго Трубчевска, гдѣ близъ города опять выходитъ глинистый слюньбаковый наносъ.

Юрово-Ивановскій оврагъ (или Собачій ровъ) тянется отъ большой дороги, начинаясь около Юрова, проходитъ къ Иванов-