

5. Бѣлый сыпучій песокъ и слѣдующ.	} 6	м.
6. Желтые пески.		
7. Оползень въ	5	»
8. До самаго уровня воды зеленовато-сѣрый свѣтлый слюньбакъ болѣе.	10	»
		27—28 м.

Неравенство высоты верхней поверхности слюньбака или его изрытость, а вмѣстѣ съ тѣмъ развитіе подобнаго ему слюньбаковаго наноса, указываетъ на происходившее здѣсь, по отложеніи его, сильное размываніе, которое, повидимому, не имѣло мѣста сѣвернѣе по Деснѣ.

Мертвые пески, налегающіе на наносъ слюньбака, и видные только выше оползня, покрыты кирпичной мергелистой глиной, которая, какъ и они, не содержитъ окаменѣлостей, но повидимому должна быть причислена къ третичнымъ образованіямъ.

Брянскъ. По шоссе, въ трехъ верстахъ отъ города, въ Толмачевскомъ логу, на верхахъ лежитъ лёсъ на 4—5 м., а внизу въ глубинѣ оврага, — глинистый рухлякъ, съ небольшою примѣсью песку.

Въ 8 верстахъ отъ Брянска по шоссе, находится хуторъ, на которомъ вырытъ колодезь, около 20 саж. глубины, и послѣдній отбросъ составляетъ глинистый мѣлъ, съ кремнемъ сѣраго цвѣта. Окаменѣлостей не видно.

Въ плоскихъ логахъ, сопровождающихъ дорогу, видны кое-гдѣ обвалы лёса, въ 2—3 метра толщины.

Въ селѣ *Глиннищевъ* выходы только краснобурой новѣйшей аллювіальной глины.

Ольшанецъ. Выходы лёсовидной бурой глины, сильно смывающейся и образующей изъ себя, при скатываніи, — валуны. Окаменѣлостей не содержитъ.

Елишевщи. При верховьи оврага выходы зеленоватаго мергеля, съ красными пятнами; м.—глинистаго характера. Ниже, — глубже, какъ это видно по отбросамъ колодцевъ, — лежитъ глинистый мѣлъ.

Толмачево. Сверху обрывовъ лежитъ красно-бурая глина на 4 м., ниже на 5—6 м. толщины сѣрозеленый слюдистый сугли-